

Zur
Kenntniss der Lungentuberkulose
des Rindes.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

o. ö. Professor und Vorstand des pathologischen Instituts

der

hohen medicinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Christian Schneider,

approb. Arzt und kaiserlich deutscher Marine-Assistenzarzt II. Classe.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Zur
Kenntniss der Lungentuberkulose
des Rindes.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

o. ö. Professor und Vorstand des pathologischen Instituts

der

hohen medicinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Christian Schneider,


approb. Arzt und kaiserlich deutscher Marine-Assistenzarzt II. Classe.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026



Die Perlucht des Rindes wurde in der Literatur von ausgezeichneten Beobachtern sowohl vom ätiologischen Standpunkte aus als auch durch eingehende pathologisch-anatomische Untersuchungen genauer Betrachtung unterzogen, hinreichend aufgeklärt und als Tuberkulose der serösen Häute anerkannt. Die eingehendsten Arbeiten hierüber verdanken wir Virchow, Klebs und Schüppel.

Virchow¹⁾ läßt den Perlknoten sich aus wucherndem Bindegewebe entwickeln, in welchem sich bald nur vergrößerte Bindegewebskörperchen, bald auch runde Kern-Zellen zeigen. Die Bindegewebskörperchen wachsen, die Kernkörperchen theilen sich, ebenso die Kerne und es werden bald 4—5 derselben sichtbar. Bei steter Zunahme werden die Zellen rundlich, ähnlich denen im Knochenmarke und zeigen spitze Ausläufer, glätten sich jedoch oft und lassen den abgehobenen Saum erkennen. Im weiteren Verlaufe findet Virchow im Inneren der Zellen fein granulirte Substanz, später Verkalkung; ähnliches will Virchow in den Lymphdrüsen des Menschen gefunden haben, wie er denn überhaupt die ganze Neubildung als ein Lymphofarkom betrachtet.

Im Jahre 1870 gelang es Klebs in Bern in seinen »Versuchen über die Uebertragbarkeit des Tuberkels«²⁾ vom ätio-

¹⁾ Virchows Archiv B. 49. P. 47.

²⁾ Virchows Archiv B. 49 P. 292.

logischen Standpunkte aus darzuthun, daß die Perlsucht ihre Entstehung demselben Virus verdanke wie die menschliche Tuberkulose. Der Perlknoten stellt nach Klebs nur eine besondere Entwicklung des Tuberkels dar, welcher mit dem sogenannten fibrösen Tuberkel des Menschen in allen Stücken übereinstimmt und sich von der gewöhnlichen miliaren Form nur durch reichliches Bindegewebe unterscheidet. Die Zusammensetzung aus Spindelzellgewebe kommt nur einem besonderen Stadium der Neubildung zu.

Von hervorragender Bedeutung ist Schüppels Arbeit über »die Identität der Tuberkulose mit der Perlsucht«³⁾ im Anschluß an Klebs. Schüppel gelang es auf Grund genauer mikroskopischer Beobachtungen zu beweisen, daß die Perlsucht als diejenige anatomische Form zu bezeichnen sei, in welcher beim Rinde die Tuberkulose auftritt; der Tuberkel ist eine Neubildung *sui generis* und nicht ein Lymphom oder Lymphofarkom. Schüppel gibt uns genaue Beschreibung der Perlknoten der serösen Häute, ihrer Entwicklung aus einer Riefenzelle. Dieselbe kann im Verlaufe des Wachstums als solche verschwinden, indem sie sich in eine Anzahl von Tuberkelzellen auflöst. Ueber die Lungentuberkulose beim Rinde sagt Schüppel nicht viel; er erkennt die Identität der Knötchen in der Lunge mit dem Tuberkel an und hält die Lungenaffektion beim Rinde untergeordnet gegenüber der Erkrankung der serösen Häute; er unterscheidet entzündliches Infiltrat und Knötchenbildung in der Lunge. Der Tuberkel liegt im interalveolären Gewebe, in der Mukosa und Submukosa der feineren Bronchen. Unter Schüppels Präsidium finden wir eine weitere Arbeit verfaßt von Riffel, »Beitrag zur Lungentuberkulose des Menschen und des Rindes.« In ihr sehen wir im Allgemeinen eine Bestätigung von Schüppels obenerwähnten Entdeckungen. Interessant ist, daß Riffel in der Umgebung der kleinsten Knötchen

³⁾ Virchow. Archiv B. 56. P. 38.

aufser Exsudatmassen auch Riesenzellen in den Alveolen gefunden hat, welche er auch in einem mikroskopischen Präparate aus verdichteten Partien der Lunge eines tuberkulösen Kindes bei Schüppel gesehen hat. Hering⁴⁾ hat ebenfalls in einer Abbildung von der Lungentuberkulose des Menschen ähnliche vielkernige Zellen dargestellt. Zum Schlusse weist Riffel auf die Identität der chronischen und akuten Lungentuberkulose hin, entgegen Buhls aufgestellter Ansicht und glaubt, daß sich ein Parallelismus zwischen der Tuberkulose und anderen, namentlich krebigen Geschwulstarten herausstellen wird. Nach ihm verhält sich nämlich die chronische Tuberkulose ebenso gut wie die akute allgemeine Miliartuberkulose zu einem primären Käseherd wie die metastatischen Krebsknoten zu der primären Krebsgeschwulst. Einen bedeutenden Schritt zur Aufklärung über die Lungenschwindfucht des Rindes hat nach meiner Ansicht Siedamgrotzky in seiner Mittheilung »Zur Kenntniss der Lungenschwindfucht des Rindes« gethan, über welche ich ausführlich zu berichten für nöthig erachte, da meine Arbeit an der Siedamgrotzkys sich anschließen soll. Die Arbeit ist eigenartig und unterscheidet sich vollkommen von den früheren, indem der Verfasser den allgemein gefassten Namen Lungentuberkulose durch strikte Diagnosen in einzelne von einander getrennte Krankheitsformen zu zerlegen versucht.

Siedamgrotzky betont, daß über die sogenannte Lungentuberkulose des Rindes große Unklarheit und Unsicherheit bestehe und die thierärztlichen Handbücher nur die Endresultate, den Untergang des Lungengewebes in Käsemasse beschreiben. Und doch verdient gerade die Lungentuberkulose des Rindes noch eingehendere Beachtung als die Perlfrucht. Eine Statistik über den Sitz der Tuberkulose beim Rinde beweist dieses am deutlichsten und läßt es gewiß zweifelhaft erscheinen, daß die Lungenaffektion beim Rinde in den Hintergrund zu treten

⁴⁾ Studien über Tuberkulose Taf. I, Fig. I.

hat gegenüber der Perlucht der serösen Häute. Die Statistik stammt von Adam und entnehme ich dieselbe Siedamgrotzkys Arbeit. Adam fand unter den in der Stadt Augsburg geschlachteten Rindern:

Jahrgang	Tuberk. d. seröf. Häute	der Lungen	d. Lungen u. d. seröf. Häute.
1871	13	10	41
1872	10	22	101
1873	19	23	68
1874	16	31	84
1875	16	59	102
1876	22	81	135
1877	33	92	149
Summe:	129	318	680

Hieraus ist zu ersehen, dass sowohl die Lungentuberkulose häufiger ist als die der serösen Häute und dass die große Zahl der gemischten Fälle auf den Gedanken hinlenken muss, ob nicht die Lungentuberkulose erst zur sekundären Form der serösen Häute geführt hat. In seiner Arbeit referirt Siedamgrotzky zunächst über den Lungenbefund von geschlachteten, Hüttenrauchs kranken Rindern im Freiburger Hüttenrauchsbezirke, woselbst käfige Pneumonie der Rinder sehr viel auftrat. In Folge der Hüttenrauchseinwirkung auf den ganzen Körper und Verdauungseingeweide kamen diese Thiere früher zur Schlachtung und war bei denselben die früheren Stadien der Lungenaffektion zu beobachten Gelegenheit geboten. Die pathologisch-anatomischen Veränderungen, welche mit einer primären Lungentuberkulose absolut nichts zu thun hatten, ergaben Bronchitis mit ihren Folgezuständen: Lungenblähung, Atelektase und Ödem, dann katarhalische und endlich käfige Pneumonie. Nur bei einzelnen Thieren ließen sich miliare Tuberkel und Perlknotten in der Nachbarschaft der Lungenläppchen nachweisen. Die mikroskopische Untersuchung ergab durch zellige Infiltration

bedingte Dickenzunahme der Bronchialschleimhaut und Ausfüllung der feineren Bronchien mit zelligen Massen; Zunahme des peribronchialen Bindegewebes; in den stärker erkrankten Lungenläppchen zeigten sich fast sämtliche Alveolen mit Epithelpfröpfen angefüllt und war Infiltration des interlobulären Bindegewebes vorhanden. Die Lungenaffektion ergab sich demnach als die Folge einer Capillarbronchitis, als eine chronisch katarrhalische, eine Desquamativpneumonie, welche im weiteren Verlaufe zu käfiger Nekrobiose führte und als Inhalationspneumonie aufgefaßt werden muß.

Siedamgrotzky geht dann über auf die Betrachtung der Lungentuberkulose selbst, bei welcher folgende Erkrankungen zu unterscheiden seien:

1) Die käfige Pneumonie, bedingt durch chronischen Katarrh der Bronchialschleimhaut, welcher sich auf die Lungenbläschen fortsetzt; solcherlei Katarrhe sind für verschiedene Bezirke der Lunge von verschiedener Bedeutung; Lungenpartien, welche die Sekretionsausscheidung durch ihre Lage erschweren, bieten den besten Angriffspunkt, daher die hinteren, unteren Ränder und der mittlere Lappen, in zweiter Linie der vordere Lappen sich ergriffen zeigen. Besonders spricht die lobuläre Form der Erkrankung für den Ausgang von den Bronchen.

2) Die eigentliche Lungentuberkulose, miliare, diffeminirte Tuberkulose, bedingt durch die Entwicklung zahlreicher, kleiner Neubildungen im gefunden Lungengewebe. Die Erkrankung ist nicht lobulär, sondern die selbst schon erheblicher von Tuberkeln durchsetzten Lungenläppchen sind noch lufthaltig und functionsfähig.

Befonders finden sich die Tuberkeln als kleine Neubildungen, als eine Zelleninfiltration in den Wandungen der Alveolen und Infundibula. Selten fehlt bei reiner Tuberkulose die Affektion der betreffenden Bronchialschleimhaut und sind Geschwüre nicht selten.

3) Käfige Pneumonie und secundäre Tuberkulose; die

ersten Spuren von Tuberkeln findet man hier wohl stets auf der Pleura und zwar da, wo käfige pneumonische Herde sich befinden. Erst in zweiter Linie gefellt sich zu den käfigen Prozessen die Tuberkulose der Lungen, am massigsten in der Umgebung der Käseherde.

Siedamgrotzky unterscheidet demnach dreierlei Prozesse, die bis jetzt bei der Lungenschwindfucht zusammengefaßt waren:

1) Die primäre Lungentuberkulose, welche annähernd so oft vorhanden ist wie reine Perlsucht.

2) Chronisch entzündliche Prozesse am besten unter dem Titel käfige Pneumonie zusammengefaßt.

Siedamgrotzky leitet sie entgegen der Ansicht Buhls von einer chronischen Bronchitis ab und bringt die Erscheinung in Zusammenhang mit dem langsamen Verlauf der meisten entzündlichen Organerkrankungen beim Rinde.

3) Gemischte Zustände, in welchen sich der käfigen Pneumonie secundäre Tuberkulose beigefellt hat. Die letztere ist wie beim Menschen durch Infektion und Resorption von einem käfigen Herde aus bedingt. Dafs nicht überall in der Nähe von käfigen Herden Tuberkeln auftreten, dafür scheint nach Siedamgrotzky ein gewisser Flüssigkeitsgrad der Käsemasse nöthig zu sein, um dieselbe infektiös zu machen. Wenigstens beobachtet man die Tuberkeleruption in der Lunge und auf der Pleura am meisten in der Nähe jener mit einer dickflüssigen Käsemasse gefüllten Cavernen, dagegen äufserst sparsam in der Nähe der durch indurirende Lungenentzündung zu Grunde gegangener Lungenlappen. Dafs Vererbung und Ansteckung allein die Ursache für Lungentuberkulose bilde, kann Siedamgrotzky nicht annehmen und glaubt, dafs jedenfalls alle Einwirkungen, welche eine Disposition zu schleichenden Entzündungen bieten, von Einfluß sind.

In der weiteren Literatur ist von Bedeutung ein Bericht

Bollingers⁵⁾, in welchem er am Beginne die Stellung der Rindstuberkulose zur menschlichen Tuberkulose bespricht. Nach Bollinger zeigt die erstere allerdings ein polymorphes Bild, indem die tuberkulösen Veränderungen beim Rind theils in Form des charakteristischen Miliartuberkels, theils als farkomartige Neubildungen meist mit entzündlichen Prozessen combinirt, endlich in Form der tuberkulösen und käsigem Entzündung auftreten. Als wichtiges Kriterium für die anatomische Diagnose stellt Bollinger den Miliartuberkel der Lymphdrüsen auf, der beim Rinde makroskopisch überaus deutlich und charakteristisch auftritt. Im Allgemeinen kann die Rindstuberkulose als eine der menschlichen Tuberkulose durchaus homologe Krankheit bezeichnet werden. Das Jahr 1880 brachte ein Referat von Klebs über zwei Arbeiten Zieglers. Während letzterer in seiner ersten Arbeit »Ueber die Herkunft der Tuberkelelemente mit besonderer Berücksichtigung der Riefenzellen« mittelst der Plättchenmethode darzuthun versucht, daß der Tuberkel als die Folge eines lokalen Reizzustandes, als eine lokale Entzündung mit Neigung zur Nekrose aufzufassen sei, gibt er in seiner weiteren Arbeit über »Tuberkulose und Schwindfucht« die Wahrscheinlichkeit zu, daß die progressiven, tuberkulösen Erkrankungen durch Organismen bedingt worden; aber Ziegler will warten bis die besonderen Pilzformen nachgewiesen sind, bevor er die Spezifität derselben anzuerkennen geneigt ist. In seinem Referat hierüber betont Klebs, daß man nicht sein Urtheil suspendiren dürfe, bis alle optischen Schwierigkeiten überwunden sind. Durch das Experiment sei es bewiesen, daß ein proliferationsfähiger Körper, also ein Organismus der Träger des Giftes ist. Das Jahr 1880 brachte Cohnheims ausgezeichnete Arbeit über die Tuberkulose; wenn letztere vorzüglich ätiologische Arbeit

⁵⁾ Bollinger: Ueber künstliche Tuberkulose, erzeugt durch den Genuß der Milch tuberkulöser Kühe. Aertzl. Intelligenz-Blatt 1879.

auch nicht direkt in mein Thema eingreift, das sich hauptsächlich histiologischen Untersuchungen zuwenden soll, so gestatte ich mir doch auf dieselbe ⁶⁾ näher einzugehen, als zu wichtig und den jetzigen Stand der Tuberkulose bis auf Kochs gleich zu erwähnende Mittheilungen klarlegend. Cohnheim sagt, daß das Vorhandensein von Riesenzellen, welche man in vielen syphilitischen und lupösen Knötchen ebenso wenig wie in den echten Tuberkeln vermisst, nicht absolut für Tuberkulose spreche, sondern lediglich die aus spezifischer Ursache hervorgegangene Verkäufung und das aus derselben spezifischen Ursache hervorgegangene Knötchen. Die anatomische Definition reiche für den Tuberkel und die Tuberkulose nicht mehr aus, sie habe der ätiologischen — dem Experiment — weichen müssen. Wer von der parasitären Natur der infectiösen Virusarten überzeugt sei, der werde an der corpusculären Beschaffenheit auch des tuberkulösen Giftes nicht zweifeln und deshalb mit Sicherheit erwarten, daß in einer hoffentlich nicht zu fernen Zukunft im Innern der Tuberkelknötchen und der scrophulösen Produkte der Nachweis jener spezifischen corpusculären Elemente gelingen werde. Ueberall da wo das tuberkulöse Virus hinkömmt und längere Zeit besteht, entstehe ein tuberkulöses oder scrophulöses Produkt, wo Tuberkelvirus eingimpft werde, dort bilde sich auch zuerst der Tuberkel. Bei der Besprechung der Miliartuberkulose weist Cohnheim darauf hin, daß er bei der jetzigen Anschauung der Tuberkulose als Infektionskrankheit die lebhaft discutierte Aufstellung Buhls, daß die miliare Tuberkulose immer einen primären Käseherd bedinge, als bedeutungslos crachten müsse, da der Käseherd nur dann mit der Tuberkulose in Verbindung gebracht werden würde, wenn er selbst schon ein Produkt des Virus ist. Es handle sich darum, woher es komme, daß das Virus in so kurzer Zeit so ungemein zahlreiche Knötchen hervorgerufen hat, und sucht den Grund darin, daß große

⁶⁾ Die Tuberkulose vom Standpunkt der Infektionslehre. Leipzig 1880.

Mengen des Virus sehr rasch in die Säftecirculation gelangen. Eine eigenthümliche Form bildet die sogenannte «lokale Tuberkulose», bei welcher die Krankheit nur auf ein oder sehr wenige Organe beschränkt ist, z. B. die fungös-tuberkulöse Gelenkentzündung. Nach Cohnheim besteht eine Analogie zwischen Syphilis und Tuberkulose; das *ulcus specificum* ohne secundäre Erkrankung des Körpers, in der Regel also der weiche Schanker, entspricht der lokalen Tuberkulose z. B. der fungösen Gelenktuberkulose, während die constitutionelle Syphilis dem correspondirt, was wir unter der gewöhnlichen mehr oder weniger allgemeinen Tuberkulose verstehen und was wir sicherlich mit ebenso gutem Recht als constitutionelle Tuberkulose bezeichnen könnten. Die tiefe Analogie zwischen der Tuberkulose und Syphilis betont Cohnheim um eines Gesichtspunktes willen — das ist die Frage der Ansteckungsfähigkeit der Tuberkulose — am Schlusse seiner Arbeit nochmals nachdrücklich. Ueber die Identität der Tuberkulose und Perlucht finden wir noch eine neuere Schrift von Carl Fleischmann⁷⁾. Derselbe glaubt annehmen zu müssen, daß ein durchgreifender histologischer Unterschied zwischen den Perluchtknoten und den tuberkulösen Neubildungen, namentlich denen der serösen Häute, nicht bestehe und daß an der Identität der Perlucht und der Tuberkulose festzuhalten sei. Eine große Differenz bestehe in der Neigung zu Verkalkungen, insoferne bei der Perlucht diese Neigung groß, bei der Tuberkulose aber äußerst gering ist; doch könne dieses wohl in besonderen Ernährungsverhältnissen der Rinder begründet sein und sei von keiner wesentlichen Bedeutung. Im Uebrigen finden wir in Fleischmanns Arbeit nur eine Bestätigung der Anschauung Schüppels; vom mikroskopischen Standpunkte aus betont Fleischmann für die Aehnlichkeit zwischen Tuberkulose und Perlucht als besonders

⁷⁾ Fleischmann, «Sind Tuberkulose und Perlucht identische Krankheitsprocese?» (1881.)

sprechend die massenhafte Neubildung von Bindegewebe, welche bei ersterer zuweilen, bei letzterer aber constant aufträte. Den Schluss, und wir dürfen sagen den Glanzpunkt in der Literatur über die Tuberkulose bildet Koch's ⁸⁾ hochinteressante Arbeit über «die Aetiologie der Tuberkulose». Koch ist es nach vielen mühsamen Experimenten und Färbemethoden gelungen, das von Cohnheim in oben genannter Arbeit so heiss ersehnte und von anderen Beobachtern — Klebs — als bestimmt vorausgesagte specifische, infectiöse Element in Form von stäbchenförmigen Bacillen bei tuberkulöser Erkrankung und perlsüchtigen Rindern zu entdecken, durch Färbemethode sichtbar zu machen und was das Wichtigste ist, den gefundenen Pilz weiter zu züchten, zu isoliren und mit den gezüchteten Bacillen neue Tuberkulose zu erzeugen. Koch färbt mit Metylenblau-Lösung und spült mit Vesuvionlösung ab; die Lösung muss alkalisch reagiren. Die hiemit sichtbar blaugefärbten Tuberkelbakterien beschreibt Koch als von stäbchenförmiger Gestalt, sehr dünn und ein viertel bis halb so lang als der Durchmesser eines rothen Blutkörperchens. Auffallend soll ihre Aehnlichkeit mit den Leprabacillen sein. An allen Punkten wo der Tuberkelprocess in frischem Entstehen und in lebhaftem Fortschreiten begriffen ist, sind die Bacillen in grosser Menge vorhanden. Ist der Höhepunkt der Tuberkeleruption überschritten, so werden auch die Bacillen feltener und können vollständig verschwinden. Die Bacillen liegen hauptsächlich in den Riefenzellen und bilden den Grund für das Entstehen derselben. Bei der Vorlegung feines Materials, das er auf Bacillen bei Mensch und Thier untersuchte, beschreibt Koch auch zehn Fälle von Perlsucht mit verkalkten Knoten in den Lungen. In sämmtlichen Fällen finden sich die Bacillen und zwar vorwiegend im Innern von Riefenzellen, welche in dem die kalkigen Massen umschliessenden Gewebe

⁸⁾ Koch, «Die Aetiologie der Tuberkulose»; Berliner klinische Wochenschrift (1882).

sich befinden. Die Vertheilung ist meist eine solch' gleichmässige, dass kaum eine Riesenzone zu finden ist, welche nicht Bacillen in mehr oder weniger grossen Anzahl umschliesst. Auch in den Bronchial- und Mesenterialdrüsen konnten die Pilzformen nachgewiesen werden. Bei drei weiteren Fällen, in welchen die Rindlungen glattwandige, mit dickbreiiger, käseartiger Masse gefüllte, kuglige Knoten enthielten und welche als bronchiektatische Herde beschrieben und nicht zur Tuberkulose gezählt werden, fand Koch ebenfalls Riesenzellen und in diesen Tuberkelbacillen. Auf Grund seiner zahlreichen Beobachtungen hält es Koch für erwiesen, dass bei allen tuberkulösen Affectionen des Menschen und der Thiere constant die als Tuberkelbacillen bezeichneten Bakterien vorkommen und es gelte nun festzustellen, dass die Tuberkulose eine durch die Einwanderung von Bacillen veranlasste und durch das Wachsen und die Vermehrung derselben bedingte parasitäre Krankheit sei. Zu diesem Zwecke mussten die Bacillen vom Körper isolirt und solange in Reinkulturen fortgezüchtet werden, bis sie von jedem etwa noch anhängenden, dem thierischen Organismus entstammenden Krankheitsprodukt befreit sind und schliesslich durch Uebertragung der isolirten Bacillen auf Thiere das gleiche Krankheitsbild der Tuberkulose erzeugt werden. Dies gelang Koch mittelst auf Blutserum angelegter Bacillencolonien und Isolirung von Reinkulturen in einer grossen Menge von Versuchen, welche unter den besten Cautelen und unter Zuhilfenahme von Controlthieren überall positives Resultat ergaben. Die Bacillen wachsen nur bei einer Temperatur zwischen 30° und 41°C., können also nur im thierischen Organismus leben, sind ächte Parasiten.

Aber nicht nur in den Organen selbst, auch in den Sputis der Phthisiker fand Koch zahlreiche Bacillen und erzeugte wieder mit denselben ebenso sicher Tuberkulose bei Thieren als wie nach Impfung mit Miliartuberkeln. Auch eingetrocknetes Sputum behält seine Virulenz (bis vier Wochen) und ist

demnach wohl anzunehmen, daß durch verstäubte Sputa auf dem Wege der Inhalation wieder Tuberkulose erzeugt werden kann. Sehr der Beachtung verdient das langsame Wachstum der Tuberkelbakterien, welches höchst wahrscheinlich bewirkt, daß die Bacillen nicht, wie beispielsweise die Milzbrandbacillen, welche ungemein schnell wachsen, von jeder beliebigen kleinen Verletzung aus zu inficiren vermögen. Die Bacillen müssen also Zeit haben, um sich einnisten zu können. Daher ist es erklärlich, daß kleinere Verletzungen bei Sectionen von Tuberkulösen nicht wieder Tuberkulose hervorrufen; die Bacillen finden hier keine Zeit, keinen geeigneten Boden zur Entwicklung, werden eliminirt, ehe sie sich weiter entwickeln können. Ebenso muß man annehmen, daß die bei Inhalation in die Lunge gelangenden Tuberkelpilze bei gefunder Lunge keine Bedingung für das Haftenbleiben dortselbst finden, sondern stagnirendes Sekret, oder Entblößung der Schleimhaut von Epithel etc. vielleicht die Infektion ermöglichen. Sonst müßte ja Alles infektiös werden, was sich in der Umgebung Tuberkulöser aufhält. Wollen wir also das Gebiet der Tuberkulose möglichst beschränken, so müssen alle Quellen, aus denen der Infektionsstoff fließt, so viel es in menschlicher Macht liegt, verschlossen werden. Eine Haupt-Quelle bietet gewiß das Sputum der Phthisiker, eine andere unzweifelhaft die Tuberkulose der Haus-thiere, in erster Linie die Perlsucht. Da die Perlsucht als identisch mit der Tuberkulose bewiesen ist, so ist gewiß durch den Genuß von Fleisch oder Milch perlsüchtiger Rinder für tuberkulöse Erkrankung große Gefahr gegeben, insbesondere da das Uebergreifen tuberkulöser Prozesse auf die Milchdrüse der Kuh von Thierärzten nicht selten beobachtet worden ist. Wir müssen also Tuberkulose und Perlsucht nach Koch's Arbeit als eine exquisite Infektionskrankheit betrachten.

Angeregt von meinem verehrten Lehrer Herrn Profeffor Bollinger und im Anschluß an Siedamgrotzky's Arbeit habe ich es mir zur Aufgabe gesetzt, die Lungenaffektionen

der mit Perlfucht behafteten Rinder vom pathologisch anatomischen Standpunkte aus weiter zu verfolgen. Meine Untersuchungen erstrecken sich auf genaue makroskopische und mikroskopische Beobachtungen erkrankter Lungen perlfüchtiger Rinder. Das Material hierzu wurde mir durch die Güte der Herren Direktor Röbl und Thierarzt Strobel aus dem städtischen Schlachthause zu München, in welchem zahlreiche Fälle zur Schlachtung kamen, in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt. Die lange in Alkohol gehärteten, zur mikroskopischen Untersuchung zurückgelegten Stücke wurden mittelst des Mikrotoms in feine Schnitte zerlegt und hiebei besonders Stellen berücksichtigt, bei welchen Neubildung und entzündliches Infiltrat zusammen oder getrennt bereits makroskopisch nachgewiesen werden konnten. Ein exquisiter Fall von secundärer Tracheltuberkulose wurde ebenfalls verwandt.

Bevor ich zum Thema selbst übergehe, halte ich eine kurze Skizzirung der normalen Histologie der Rindslunge, welche ich aus Süssdorfs Arbeit »Ueber die Lungenfeuche des Rindes« entnommen habe, für angezeigt und lasse zugleich eine Zeichnung des normalen Alveolargertüftes einer gefunden Rindslunge folgen. (Tafel I.)

Die Rindslunge zeigt eine stärkere Lappung wie die des Pferdes, links meist drei, rechts vier bis fünf deutlich getrennte Lappen; der hinterste ist stets der größte. Die vorderen Lappen sind durchgängig kleiner, von mehr oder weniger keilförmiger Gestalt und von 3 resp. 4 Kanten und Flächen begrenzt. Sie sind durch scharfe Einschnitte abgegrenzt und hängen hauptsächlich durch die mit einander verwachsene Pleura zusammen. Die Lungenwurzel hat ihre Lage auf der medialen Fläche in der Gegend der Grenze zwischen Mittel- und Hinterlappen; der hier eintretende Bronchus gibt sehr bald entsprechende Aeste für die vorderen Lappen ab, welche im rechten Winkel gegen die Richtung des Bronchus sich einfenken. Der vorderste Lappen enthält gewöhnlich einen

befonderen Bronchus; die rechte Lunge ist die größte. Die einzelnen kastanien- bis kirschkerngrossen Lobuli sind abgegrenzt durch feines, leicht verschiebbares, weitmaschiges Zellgewebe. Dieselbe Gewebsmasse begleitet auch die Bronchialverzweigungen und Gefäße; andererseits werden wieder größere und kleinere Lobuli vereinigt durch breitere Bindegewebszüge von den anderen abgefordert. Das Mikroskop läßt an den feineren Bronchialverzweigungen 1) eine aus weitmaschigem Fafergewebe bestehende Bronchialscheide, 2) eine longitudinale und circuläre Muskelschicht und 3) die Mukosa mit zahlreichen, hohen Falten erkennen, in deren Basis sich elastische Fasern und muskulöse Gebilde befinden. In den feinsten Bronchiolis sehen wir keine Faltenbildung, die Muskularis bildet eine Lage mit der Mukosa und elastischen Bestandtheilen und verschlingt sich zu unregelmässig durch einander laufenden Fasern. Gegen die Infundibula zu wird das hohe Flimmer-Epithel zum kubischen Pflasterepithel. In den Infundibulis hat man die elastische Membran und die circuläre Muskelschicht zu unterscheiden. Die Lungenalveolen selbst sind kleiner wie beim Menschen und ist die sehr feine Alveolarwand von einer entsprechenden Menge elastischer Fasern durchzogen. Die Alveolen haben ziemlich große, platte Epithelzellen. Das respiratorische Capillarnetz ist so dicht, daß der Durchmesser feiner Lücken noch kleiner ist, als der Durchmesser der Capillaren und daß die Maschen zuweilen von dem rundlichen Kern der Alveolenepitheln ausgefüllt werden. Die Maschen des Zellgewebes sind nach Süssdorf als Lymphbahnen aufzufassen. Nach dem Baue der Rindslunge, bei den hohen Falten der Schleimhaut und dem engen Lumen der Bronchen ist demnach jedenfalls die Bedingung für Atelectase und etwaige andere auf Verschluss der Luft zu und abführenden Röhren zurückzuführende Vorgänge in hohem Grade gegeben. Regionen, wo hauptsächlich Bedingungen für Tuberkulose etc. liegen, sind die hinteren, unteren Ränder und der mittlere Lappen, da hier der Athmungsprocess

ein geringerer und die Expectoration eine beschränktere ist. Es wird sich demnach die sogenannte Gattungsdisposition, die Neigung zu langsamem Verlauf der Erkrankungen, zur Produktion zellenreicher und wasserarmer Exsudate auf anatomische Constitutionsanomalie zurückführen lassen.

Meine Untersuchungen erstrecken sich auf 25 Lungen tuberkulöser Rinder; das Alter der geschlachteten Thiere wurde nach der Gröfse der Lungen taxirt.

I. Fall: Anatomische Diagnose: Reine Pleura-Tuberkulose mit secundärer Infektion der Lymphdrüsen. Lunge vollständig normal. — Jüngeres Thier.

Perlfucht der Pleura auf beiden Lungen namentlich rechts, hauptsächlich am unteren scharfen Rande der rechten Lunge. Die Perlknoten in Reihen und Schnüren geordnet, meistens stecknadel- bis hanfkorngröfs, die gröfsten Linfen bis Erbsen gröfs. Die Mehrzahl der Perlknoten in centraler Verkäfung, an einzelnen Stellen vorgeschrittene käfige Degeneration. Lungengewebe vollständig frei in allen Theilen, nur durch zahlreiche feinste Ecchymosen fein röthlich gestempelt. Bronchien und Trachea vollständig normal. Bronchialdrüsen geschwellt und an einzelnen Stellen mit linfen- bis erbsengrofsen, trübgelblichen, käfigen und theilweise kalkigen Tuberkeln durchsetzt.

Mikroskopische Untersuchung wurde nicht vorgenommen.

II. Fall: Anatomische Diagnose: Tuberkulose der Pleura; Käfige Pneumonie; Atelectase und Cirrhose des Lungengewebes mit circumscripter Desquamativ-Pneumonie; käfige und bindegewebige Peribronchitis; Bronchitis; Tuberkulose (miliare) der Lunge und secundäre der Lymphdrüsen; Trachealgeschwür (tuberkulöses). — Erwachsenes Thier. — Vordere Theile fehlen.

Rechts auf der Pleura ganz vereinzelte fungöse, leicht plattgedrückte, nahezu halb haselnufsgrofs, conglomerirte Tuberkel. Diese Knoten sitzen auf gesundem Lungengewebe und sind in mäfsiger Verkäfung. Im Lungengewebe selbst sitzt eine ziemliche Zahl erbsen- bis haselnufsgrofs, käfiger Knoten.

In der Umgebung der gröfseren finden sich öfters kleinere hanfkorn- bis nahezu erbsengrofse Tochterknoten. In den hinteren Partien hühner- bis gänseeigrofse ähnliche beschaffene Herde. In der Mitte der gröfseren Herde häufig schleimige Maffen, die direkt mit einem Bronchus communiciren. An einzelnen Stellen sieht man frischere und jüngere Herde, die makroskopisch in der Umgebung gröfserer Bronchen den Eindruck käfiger Peribronchitis machen. Aehnliche Knoten auch in der linken Lunge, doch in geringerer Zahl und in weniger vorgeschrittenem Stadium. Die Trachea und Bronchen namentlich rechts enthalten reichliche Maffen von schleimigem Eiter mit käfigen Brocken vermischt. Im Hauptbronchus der rechten Lunge nahe der Bifurcation ein nahezu 50 Pfennigstück grofses Geschwür mit granulirtem Grunde. Das Ganze über die Oberfläche etwas prominirend. Lymphdrüfen meist entfernt; einige erhaltene zeigen kleinere und gröfsere käfige Knoten. Einzelne Echinococcusblasen in der Nähe der käfigen Herde.

Die mikroskopischen Schnitte (12)¹⁾ wurden durch kleinste und gröfsere subpleurale frische käfige Knoten und deren Umgebung geführt und wurden feinste Bronchenstämme hiebei getroffen, um sowohl das Verhalten der Knoten als deren Einfluss auf Gewebe und Bronchen zu beobachten.

Die Präparate ergaben zwei vollständig getrennte Bilder. In vieren zeigte sich vornehmlich Neubildung, Tuberkelbildung, in den übrigen Präparaten jedoch trat die entzündliche Form des Gewebes, der Bronchen absolut in den Vordergrund. Die Knoten waren der Mehrzahl nach in der Mitte bereits verkalkt, theils zerfallen, structurlos, zeigten am Rande jedoch noch zelligen Bau und wenige Riefenzellen; ein kleinerer, jüngerer Knoten hatte den auffallend schönen Bau eines Rundzellenfarkoms. Tuberkel fanden sich sehr spärlich in das alveoläre Bindegewebe eingestreut mit deutlichen Riefenzellen. Conglomerirte Tuberkel mit zahlreichen Riefenzellen waren in einem Präparate in der Wand eines Bronchus sehr schön zu sehen. Ebenso die progrefsigte Wucherung eines grossen, nekrotischen, käfigen Knotens in das angrenzende Lungengewebe. Die nächste Umgebung der Knoten zeigte sich durchgängig, mit Ausnahme eines Falles, wo nur geringe subakute, entzündliche Wucherung im Bindegewebe zu finden

¹⁾ Zur Färbung der Schnitte wurde Karmin-, Saffranin-, Shakepeare- und Noris- und Bismarkbraunlösung benützt. Die beste Färbung an Kern- und Doppelfärbung ergab weitaus Shakepeare und Noris; sehr schöne Präparate ergaben Saffranin und Bismark.

war, deutliche Verdichtung und Verbreiterung des alveolären Gerüsts (I. Stadium der Cirrhose), das Gewebe comprimirt, die Alveolen zusammengedrückt, oft mit zahlreich abgeschürften Epithel gefüllt; circumscripte beginnende, parenchymatöse Pneumonie. Das übrige von den Knoten entferntere Gewebe war ebenfalls krankhaft verändert. Ausser Bindegewebszunahme und Cirrhose ebenfalls circumscripte, oft nur 6—7 Alveolen umfassende Desquamativ-Pneumonie; Ausfüllung der Alveolen mit Epithel, die Pleura oberhalb der Knoten zellig infiltrirt verdickt. Die Bronchen hatten die stärkste Veränderung aufzuweisen; fast alle waren in ihrem Lumen erweitert, mit eitrigem Sekret vollgepfropft. Ihre Wandungen zeigten bindegewebige Wucherung (Taf. I. Fig. 2.), in einem Falle Hypertrophie der Muskularis. Die Bronchen selbst durch den Druck der Neubildung und der Bindegewebszunahme comprimirt, theils colabirt. Bindegewebige und käfige Peribronchitis, Bronchitis. Eine auffallende Erscheinung bildeten in fünf Präparaten grosse, dunkle, stark tingirte, rund-ovale Zellen mit grossem Kerne und Spuren von Pigment, die durch ihre dunkle Färbung gegenüber der Präparatfärbung sich scharf abheben (sowohl bei Bismark-, wie Shakepeare- und Noris-Färbung). Die Zellen liegen unregelmässig geordnet, besonders in dem zugenommenen peribronchialen, interlobulären und interalveolären Bindegewebe (Taf. II), liessen sich jedoch nicht in allen Schnitten, sondern nur in vier, dort aber in gleicher Schärfe bei verschiedener Färbung nachweisen.

III. Fall: Anatomische Diagnose: Beginnende käfige Tuberkulose beiderseits; Lobuläre käfige Pneumonie; Cirrhose (letztes Stadium) des Lungengewebes; Desquamativ-Pneumonie; Atelectase; Bindegewebige Peribronchitis; Tuberkulose und purulente Bronchitis. — Erwachsenes Thier. —

Auf der Pleura rechts einige grössere, schwammige, conglomerirte, grau-faustige Tuberkel (gestielte Perlknoten), welche im Inneren nur geringgradige Verkäsung zeigen. Das Lungengewebe in den mittleren und vorderen Partien links im Umfange einer doppelten Mannesfaust von dicht gedrängten, lobulären, käfigen Herden durchsetzt, welche die Oberfläche grob-höckerig erscheinen lassen und beim Einschneiden sich als vollständig verkäst und an einzelnen Stellen erweicht erweisen. Die übrigen Theile der linken Lunge fast vollständig frei; in der rechten

finden sich ebenfalls in den mittleren und unteren Parteen ähnlich beschaffene, lobulär-käfige Herde, deren Oberfläche jedoch mit den bereits erwähnten conglomerirten Perlknötchen besetzt erscheint. In den grösseren Bronchien einzelne bis Hanfkorn grosse, in beginnendem Zerfall begriffene Tuberkel. Ausserdem Schleim und Eiter in mässiger Menge. Bronchialdrüsen fehlen.

Die mikroskopischen Schnitte wurden durch kleinere, lobulär geordnete Herde und deren Umgebung an fünf verschiedenen Stellen geführt.

Die Knötchen waren in erhöhterem Zerfalle begriffen wie vorher und liessen zelligen Bau kaum mehr am Rande erkennen; frische Tuberkel, Riesenzellen konnten nicht nachgewiesen werden. Dagegen zeigte sich das die Knötchen umgebende Gewebe wieder in erhöhtem Stadium der interalveolären, bindegewebigen Wucherung — letztes Stadium der Cirrhose — mit fast vollständiger Hepatification des Gewebes. Die Alveolen waren zum Theil obliterirt, theils mit zerfallenem Epithel vollgepfropft und comprimirt. Zwei Präparate zeigten wieder die im vorhergehenden Falle beschriebenen, eigenthümlichen Zellen in gleicher Anordnung und Form. Peribronchitis war weniger ausgesprochen.

IV. Fall: Anatomische Diagnose: Subakute tuberkulöse Pleuritis; lobuläre und sublobuläre käfige Pneumonie; Atelektase des umgebenden Gewebes; eitrig Bronchitis. — Aelteres Thier. —

Auf der linken Pleura eine ziemlich diffuse, rahmartige Bindegewebswucherung mit zahlreich eingestreuten Miliartuberkeln. Aehnlich verhält sich die Pleura rechts. In der Lunge links, namentlich in den vorderen, mittleren und oberen Parteen ziemlich zahlreiche, lobuläre und sublobuläre, käfige, theilweise erweichte Knötchen. Dazwischen atelektatisches und leicht cyanotisch gefärbtes Lungengewebe. In der rechten Lunge nur mehr vereinzelte erbsen- bis haselnussgrosse lobuläre Herde. Bronchien und Trachea frei; Inhalt etwas schleimiger Eiter. Bronchialdrüsen fehlen.

Zwei mikroskopische Schnitte wurden durch einen kleineren käfigen Knötchen mit Umgebung an verschiedenen Stellen geführt. Dieselben ergaben nichts bemerkenswerthes.

V. Fall: Anatomische Diagnose: Tuberkulose der rechten Pleura; käfige lobuläre und sublobuläre

Pneumonie; Desquamativ-Pneumonie; Lungen-Cirrhose mit hypertrophischen Bronchiaktasien (akut. und chron.); Bindegewebige Peribronchitis (akut. und chron.); Eitrige Bronchitis. — Erwachsenes Thier. —

Linke Lunge zeigt normale Pleura, nur an einzelnen Stellen unter derselben hantkorn- bis kirschkerngroße, sehr sparame, käfige Einlagerungen. Im zungenförmigen Vorderlappen ein welschnußgroßer, käfiger Knoten und von diesem aus nach Aufsen und Vorne im Umfange eines halben Hühneries das Gewebe frisch sublobulär infiltrirt. Die Schnittfläche grob granulirt, nur aus stecknadelkopf- bis hantkorngroßen grauen und ziemlich derben Knötchen zusammengesetzt, welche feine gelbliche Einlagerungen, beginnende Verkäufung erkennen lassen. Die rechte Lunge zeigt nur auf der Innenfläche des Innenlappens einzelne fungöse, plattgedrückte Perlknoten, welche sich direkt aus käsig hepatisirtem Lungengewebe erheben. Der größte Theil des Hinterlappens im Umfange eines Mannskopfes in lobulärer, vorgeschrittener Verkäufung. Einzelne Lobuli hühner- bis gänseei groß. Alle von einander getrennt durch derbe, milchweiße Bindegewebszüge. An der Grenze gegen das gesunde Lungengewebe hin, graue, frisch infiltrirte, bis kirschkerngroße Knoten, die Spuren der beginnenden Verkäufung erkennen lassend. Trachea und Bronchen enthalten eine mäßige Menge Schleim; keine Geschwüre. Bronchialdrüsen fehlen.

Die Schnitte wurden durch frisch infiltrirte Umgebung eines großen käfigen Knotens gegen das gesunde Lungengewebe hin geführt; ein Knoten wurde hierbei nicht mehr getroffen. Das infiltrirte Lungengewebe zeigte theils frische pneumonische Infiltration, theils chronische interalveoläre Verdichtung und Wucherung. Die Alveolen zum Theil mit Epithel gefüllt; stark ausgebildete bindegewebige Peribronchitis, eitrige Bronchitis. Die feineren Bronchen mit theilweise zerfallenen Eiterzellen gefüllt. In höherem Maße wie bei den anderen Präparaten machte sich besonders bei Saffranin-Färbung das massenhafte Auftreten der erwähnten Zellen, besonders in der Umgebung der Bronchen und im interalveolären Gewebe bemerkbar. Tuberkel, Riesenzellen wurden nicht aufgefunden.

VI. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits bindegewebige Pleuritis; lobuläre und diffuse käfige Pneumonie; Lungencirrhose mit Bronchiektasien; eitrige Bronchitis. — Jüngeres Thier. —

Pleura beiderseits normal, an einzelnen Stellen entsprechend größeren Lungeninfiltrationen milchig getrübt und verdickt. Im mittleren und vorderen Theil der linken Lunge ungefähr in der Ausdehnung eines Kindskopfes dicht an einander liegende welschnufs- bis gänseeigroße mit käsigen, trübgelblichen Massen gefüllte Knoten und Höhlen, von denen die größten deutlich als Bronchiektasien erkennbar sind; sämmtliche Herde von derben Bindegewebskapfeln umgeben. In den größeren Bronchen große Mengen von käsigen und schleimigen Produkten. Im Hinterlappen der rechten Lunge ein über kindskopfgroßer, mit eingedickt schleimig-käsigen Massen gefüllter Herd. Das Ganze von einer dicken Bindegewebskapfel umgeben. Im Mittellappen der rechten Lunge fernerhin ein kindskopfgroßes, ähnlich beschaffenes, aus lobulären, käsigen Herden bestehendes Infiltrat. In den Bronchen ähnlicher Inhalt wie links, nur geringer. Bronchialdrüsen fehlen.

Die mikroskopische Untersuchung wurde nicht vorgenommen.

VII. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits tuberkulöse Pleuritis; rechts noch fibrinöse. Miliartuberkulose der Lunge; Käfige Pneumonie; Croupöse Pneumonie; Lungen-Cirrhose; Bindegewebige Peribronchitis; Käfige Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Jüngerer Thier. —

Auf der Pleura beiderseits, namentlich aber rechts eine mäßige Zahl grau-geblich aussehender, hanfkorn- bis haselnufs-großer, conglomerirter Perlknoten in mäßiger Verkäufung und beginnender Verkalkung, eingebettet in zartes, sparsames Bindegewebe. Lungengewebe enthält nur vereinzelte subpleural gelegene hanfkorngroße Knoten. Am hinteren Ende der rechten Lunge ein ziemlich frischer, nahezu hühnereigroßer, grob granulirter Knoten, der auf der Schnittfläche eine auffallende Aehnlichkeit mit Perlknoten zeigt. Im Innern punktförmige Verkäufung und Verkalkung, gegen das gesunde Gewebe zu frische über Stecknadelkopf große, dicht conglomerirte Knötchen. In der linken Lunge ein pflaumengroßer, käsiger, kalkiger Herd abgekapselt, in der Umgebung kleinerer, käsiger Knötchen. Eine noch vorhandene Bronchialdrüse zeigte partielle Verkäufung und Verkalkung; größere Bronchen und Trachea frei. Die 20 mikroskopischen Schnitte gehen durch lobulär infiltrirtes Gewebe in der Nähe eines großen Perlknoten auf der Pleura und die Umgebung des Infiltrates bis in gesundes

Lungengewebe. Auch hier wieder haben wir es hauptsächlich mit entzündlichen Erscheinungen zu thun. Hochgradige parenchymatöse Verdickung mit secundärer Verkleinerung der Alveolen, chronische, interalveoläre und peribronchitische, diffuse Bindegewebszunahme und Verdickung mit Verbreiterung des Gerüsts; zugleich interstitielle, interlobuläre Verdichtung längs der gröfseren Gefäße und Bronchen; in einem Präparate deutliche Hypertrophie des Muscularis eines gröfseren Bronchus (Muskelcirrhose). An einzelnen Stellen pneumonische Infiltration des Lungengewebes, insbesondere in der Umgebung eines kleinzelligen Knotens. In einem Präparate zeigten sich die sonst unveränderten Alveolen bei stark infiltrirtem, cirrhositischem interlobulärem Bindegewebe und zelliger Infiltration des interalveolären Gerüsts in der Umgebung eingestreuter kleinster Knötchen mit gelben, croupösen Pfröpfen ausgefüllt. Zwei Miliartuberkel von durchaus kleinzelliger Structur fanden sich in lufthaltigem Lungengewebe eingelagert. In einem anderen Präparate fand sich scharf abgegrenzt durch interlobuläres Bindegewebe von einer lufthaltigen Partie ein kleinzelliges Infiltrat in Form kleinster und gröfserer, confluirender, akuter und subakuter Miliartuberkel, die wenig regressive Metamorphose (Taf. III, Fig. 1.) zeigten, mit guten Riesenzellen; das interalveoläre Gewebe war zellig infiltrirt. Derselbe Schnitt (Saffraninfärbung) zeichnete sich durch zahlreiche Entwicklung tiefdunkel gefärbter Maltzellen aus, die besonders in dem das infiltrirte Gewebe vom gefunden trennendem interlobulären Bindegewebe unregelmäfsig geordnet lagen; an einem anderen Schnitte waren die Zellen zahlreich in cirrhotischem Gewebe bis in die Wandung eines Blutgefäfses, die Schleimhaut eines quer getroffenen Bronchus und deren Epithelschicht aufzufinden (Taf. III, Fig. 2.). In weiteren drei Präparaten fanden sich dieselben Zellen in ähnlicher Anordnung im Bindegewebe.

VIII. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits tuberkulöse Pleuritis, rechts fibrinöse Pleuritis; Lobuläre rechtsseitige käfige Pneumonie; Miliare Lungentuberkulose: Lungen-Cirrhose und Atelectase; Bindegewebige und tuberkulöse Peribronchitis; Purulente und tuberkulöse Bronchitis. — Erwachsenes Thier. —

Auf der Pleura links einige hanfkorn- bis halb pflaumen-große Perlknoten, namentlich in den vorderen Parteen; nach

Hinten ebenfalls einzelne, auf knollig infiltrirtem Lungengewebe aufsitzend. Rechts ist die Zahl der Perlknoten nach Hinten etwas reichlicher, daneben eine mässige bindegewebige Pleuritis. Im Lungengewebe findet sich links in den oberen, mittleren und hinteren Parteen eine ziemliche Menge lobulärer, käfiger Knoten, meistens haselnussgröfs, im Centrum cavernös erweicht und von einer dicken Bindegewebskapsel umgeben. Dazwischen das interlobuläre Bindegewebe stark vermehrt, etwas cyanotisch gefärbt und das angrenzende, noch etwas Luft haltende Gewebe vielfach atelektatisch. An einzelnen Stellen zeigt die Innenwandung dieser käfigen Herde und Knoten vielfach eine glänzende Beschaffenheit wie Bronchialschleimhaut (die sofort vorgenommene mikroskopische Untersuchung bestätigte die Vermuthung). In den Bronchen reichliche Mengen schleimigen Eiters. Die Bronchialwandung selbst in den betreffenden Theilen durch gröfsere und kleinere, meist bis linsengroße, halbweiche Wucherungen von grauröthlicher Farbe grob granulirt. Die Mehrzahl anscheinend durch von Aussen in das Bronchiallumen hineinwuchernde Tuberkel erzeugt. Der Mittellappen links zeigt zahlreiche Bronchiektasien mit gelblich eitrigem Inhalt gefüllt. (In dem gelblichen Brei finden sich zahlreiche Mengen von Eiern des *Distomum hepaticum*, ausserdem Körnchenzellen und eine große Menge von fettigem Detritus.) In der rechten Lunge sind die vorderen und mittleren Parteen vollständig normal, in den hinteren und oberen Theilen ähnlicher Befund wie links; an einzelnen Stellen lässt sich der direkte Zusammenhang der käfigen Cavernen mit dem Lumen gröfserer Bronchen nachweisen. Die Bronchialschleimhaut ähnlich wie links grob granulirt durch zahlreiche, kleinere und gröfsere halbweiche Knoten, die theilweise dunkelroth gefärbt erscheinen und an einzelnen Stellen zu gröfseren Geschwüren zerfallen sind. Bronchialdrüsen fehlen.

Zur mikroskopischen Untersuchung hielt ich ein Stück käfiger Infiltration mit scharfer Abgrenzung gegen das gesunde Lungengewebe hin für geeignet. Die Schnitte ergaben die Knoten theils cirrhotisch, theils verkäst in verdichtetes Lungengewebe eingebettet. In der Umgebung interlobuläre, demarkirte Entzündung, interalveoläre Zelleninfiltration, starke bindegewebige Peribronchitis; in einem Präparate starke Vermehrung der Muskelzellen der Muscularis, ausserdem käfige Peribronchitis und Bronchiektasien. Drei Miliartuberkel fanden sich in das interalveoläre Gewebe des angrenzenden gefunden Lappchens eingestreut.

IX. Fall: Anatomische Diagnose: Tuberkulöse Pleu-

ritis beiderseits, fibrinöse Pleuritis links; Käfige Pneumonie rechts; Lungencirrhose; Eitrige Bronchitis. — Jüngeres Thier. —

Auf der Pleura links namentlich nach Vorne und in der Mitte eine mässige Zahl von traubenförmigen, meistens hanfkorn- bis erbsengroßen Perlknoten, die vielfach gestielt in bindegewebiges Gerüst eingelagert erscheinen; auf den entsprechenden Theilen der rechten Lunge, vorn und in der Mitte finden sich ebenfalls eine mässige Zahl ähnlich beschaffener, gestielter Perlknoten; die grössten halb Feigen groß, namentlich am freien, äusseren Rande sitzend. Die Perlknoten befinden sich zum grössten Theil in vorgeschrittener Verkäufung und Verkalkung. Lungengewebe links vollständig normal. Im Gewebe selbst eine mässige, schiefrige Pigmentirung. In der rechten Lunge finden sich nach vorne kleine Bronchiektasien mit eingedicktem, theilweise ziemlich trockenem eitrig-käfigen Inhalt. Das umgebende Gewebe cyanotisch und grobkörnig infiltrirt. Im Mittel- und Hinterlappen das Gewebe normal, nur an einer Stelle ein etwa hühnereigroßer käfiger Herd; bei näherer Untersuchung besteht derselbe aus vielfach mit einander communicirenden Bronchiektasien. Die Bronchialschleimhaut dunkel geröthet, saftig, glänzend. Am hintersten Rande ein kleiner nahezu haselnussgroßer Herd, theils aus Bronchiektasien, theils aus frischem, grauen, lobulären Infiltrat bestehend. In den großen Bronchen und Trachea nichts Abnormes. Bronchialdrüsen fehlen.

Mikroskopische Untersuchung wurde nicht vorgenommen.

X. Fall: Anatomische Diagnose: Bindegewebige Pleuritis beiderseits (auffallend der Mangel von Perlknoten bei der sonst hochgradigen Infiltration der Lunge); Lobuläre und diffuse käfige Pneumonie; Miliare, diffeminirte Lungentuberkulose; Lungen-Cirrhose (letztes Stadium) mit Bronchiektasien (hyertrophischen); Muskel-Cirrhose; Käfige und bindegewebige Peribronchitis; Tuberkulose, eitrige und käfige Bronchitis; Tuberkulose der Trachea und käfige Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Ausgewachsenes Thier. —

Beide Lungen wiegen mindestens 20—25 Pfund. Linke Pleura vielfach getrübt, verdickt, aber ohne eigentliche

Perlknoten; ebenso rechts. Der grösste Theil der linken Lunge ist durch kinds- bis mannskopfgrosse Infiltrate derb, theils fluctuirend anzufühlen. Im Vorder-Lappen der linken Lunge eine mässige Zahl erbsen- bis haselnussgrosser, käfiger, halbweicher Herde mit verdickter Kapfel. An einer Stelle im Umfange eines Lobulus ein frisches, graukörniges Infiltrat, von welchem die kleineren Tuberkel verdächtig aussehen; im mittleren Theile finden sich zwei übergänseeigrosse Herde, aus conglomerirten kleineren Herden zusammengesetzt. Von den peripheren Theilen zeigen einzelne Stellen ähnliches Verhalten wie der vorhergehende beschriebene Herd. Im mittleren und oberen Theil der Lunge ein über kindskopfgrosser Herd, der alle Stadien frischerer und älterer Infiltration und Verkäfung zeigt. Die frischeren Infiltrate sind von hellgrau-gelblicher Farbe; die Lobuli durch dieselben grob granulirt und auf der Schnittfläche das Ganze fein gelblich, offenbar durch beginnende Verkäfung und Verfettung punktirt. In der Mitte des ganzen Herdes verläuft ein hochgradig mit tuberkulösen Geschwüren bedeckter Bronchus. Im hinteren und oberen Theile des Hinterlappens ein weiterer nahezu mannskopfgrosser Herd, der sich allgemein ebenso verhält wie der soeben geschilderte. Im entsprechenden Hauptbronchus eine grosse Zahl meist linsengrosser, vielfach confluirender und in beginnender, oberflächlichen Ulceration befindlicher tuberkulösen Wucherungen. Rechte Lunge zeigt im zungenförmigen Vorderlappen eine diffuse Einlagerung von käfigen Herden, von denen die Mehrzahl mit Bronchen in direkter Communication steht. Letztere erweitert. Schleimhaut dicht mit linsengrossen Wucherungen bedeckt. Im Hinterlappen ähnliche kleinere und grössere Infiltrate wie links, daneben käfige Bronchiektasien und kleinere ifolirte Knoten. Trachea und Bronchen enthalten reichliche Mengen schleimig-eitrigen Inhaltes; im untern Theil der Trachea käfige Knoten und Geschwüre; Bronchialdrüsen stark vergrössert, von kleineren und grösseren käfigen Knoten durchsetzt. Im rechten Vorderlappen macht die ganze Anordnung den Eindruck einer käfigen Peribronchitis. Die beiden mikroskopischen Schnitte führen durch frisches graukörniges Infiltrat im Umfange eines Lobulus. Die in das alveolare Gewebe eingestreuten Knoten zeigen theils amorphe Structur, theils aus dicht gedrängten Zellen bestehend den Bau von Fibro-farkomatösen Gewebe mit sehr sparsamen Riefenzellen. Das Lungengewebe selbst stark verdichtet, zellig infiltrirt, die Alveolen nicht mehr abgrenzbar von dem interlobulären Gewebe. Das Bild chronischer interlobulärer Pneu-

monie mit Ausgang in Cirrhose; dabei mangelt Pigmentbildung im Unterschiede von derselben beim Menschen. Die Bronchen zeigen sich theilweise erweitert, mit starker bindegewebigen Wucherung umgeben, in welcher oft käfige Knoten mit zelliger Infiltration der Umgebung eingestreut sind; in einem Präparate war ein gröfserer Bronchus von einem in stark entwickeltes, zellig infiltrirtes Bindegewebe eingekapselten, theils central verkästen, theils zelligen Bau zeigenden Knoten durchbrochen; ausserdem an verschiedenen Stellen ausgeprochene muskuläre Wucherung, enorme Mengen dichtgedrängter glatter Muskelfasern, besonders in der Nähe grösserer Gefässe. (Muskuläre Cirrhose nach Buhl.)

XI. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits tuberkulöse Pleuritis; Käfige Pneumonie; Bronchiektasien; Käfige Peribronchitis; Käfige Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Nicht ganz ausgewachsenes Thier. —

Mässige Perlucht der Pleura links vorne, stärkere entlang dem ganzen scharfen Rande der Lunge. Die grössten Knoten welschnufsgrofs in mässiger Verkäfung und geringer Verkalkung. In der rechten Lunge eine mässige Zahl hanfkorn- bis haselnufsgrofsen käfiger Herde, die gröfseren central zerfallen, theilweise Bronchiektasien darstellend. Aehnlicher Befund links, wo die Knoten namentlich in den hintersten und oberen Partien ihren Sitz haben; einzelne auch im zungenförmigen Vorderlappen. Bronchialdrüsen in hohem Grade verkäst und verkalkt. Mikroskopische Untersuchung unterblieb.

XII. Fall: Anatomische Diagnose: Tuberkulöse Pleuritis beiderseits; Tuberkulose der Lungen; Käfige Pneumonie; Akute Desquamativpneumonie; Chronische Lungencirrhose mit Bronchiektasien und Atelektase; Zellige und bindegewebige Peribronchitis; Bronchial- und Trachealtuberkulose; Eitrige Bronchitis. — Ausgewachsenes Thier. —

Auf der rechten Pleura an einer Stelle ein flacher Perlknoten, der mit einem faustgrofsen Knoten der Lunge direkt in Zusammenhang steht. Auf der linken Lunge ebenfalls nach Vorne ein grofsen flacher Perlknoten nahezu vom Umfange einer ausgestreckten Manneshand, fein granulirt, saftig und auf einer mit käfigen Herden versehenen Lungenpartie direkt auf-

sitzend. Im Lungengewebe rechts ganz vereinzelte bis kirschen-große, frische und ältere, grauäufige, conglomerirte Tuberkel. In der linken Lunge in den hinteren und mittleren Partien ein über Faust großes Conglomerat von käfigen Herden, die Mehrzahl mit Bronchen in direkter Communication. Bronchial- und Trachealtuberkulose leichten Grades. Drüsen fehlen.

Die sechs mikroskopischen Präparate stammen von einem kirschgroßen, subpleuralen Perlknoten und dessen Umgebung, sowie von infiltrirtem Gewebe in der Nähe käfiger Knoten und ausgedehnter Bronchiektasien. Der Knoten zeigt sich in der Mitte verkalkt, an der Peripherie bindegewebigen Bau, cirrhotisch; das umgebende Gewebe bei sonst normalen Bau mit herdförmigen, entzündlichen Infiltraten durchsetzt, die Alveolen theilweise mit Epithel gefüllt; dortselbst zellige Peribronchitis. Das infiltrirte Gewebe zeigt starke Verdichtung und Verbreiterung des interlobulären Gewebes, zellige Infiltration des interlobulären Gerüsts; die Alveolen waren theils comprimirt, das Gewebe atelektatisch; außerdem starke bindegewebige, peribronchiale Wucherung, so dass in einem Falle die hohen Falten eines kleinen Bronchus bei verengtem Lumen sich dicht zusammengedrückt zeigten. Miliare Tuberkelbildung konnte nicht nachgewiesen werden. Die größeren Bronchen waren mit eitrigem Sekret gefüllt.

XIII. Fall: Anatomische Diagnose: Käfige lobuläre Pneumonie; Tuberkulose (in leichter Verkäufung) der Bronchialdrüsen. — Junges Thier, kaum 1 Jahr alt. —

Pleura vollständig normal, in der Lunge rechts im Vorderlappen ein an Welschnuß großer, conglomerirter Knoten aus käfigen, kirschkerngroßen Herden zusammengesetzt. Aehnliche halbweiche, käfige Knoten finden sich unter der Innen-Fläche der rechten Lunge nahe der Lungenwurzel; in den übrigen Theilen der Lunge rechts einzelne ähnlich beschaffene, käfige Herde; ebenso in der linken Lunge vereinzelte, meistens conglomerirte hantkorn- bis erbsengroße Knoten in vorge-schrittener Verkäufung. Die größeren Bronchen normal, in den Bronchialdrüsen, die kaum vergrößert, erscheinen ganz vereinzelte bis hantkorngroße Knötchen, im Centrum verkäuft.

Mikroskopische Untersuchung unterblieb.

XIV. Fall: Anatomische Diagnose: Rechtsseitige, tuberkulöse Pleuritis; Reine Lungentuberkulose geringgradigster Natur; Käfige Pneumonie; Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Jüngeres Thier. —

Pleura im Allgemeinen normal, nur rechts finden sich ganz vereinzelte, doppelt linfengrofse graue Perlknotchen. Im Lungengewebe selbst rechts einzelne, bis kirchgrofse graue Knoten, welche unregelmäßige Verkäufung zeigen. Hie und da deutlicher Zusammenhang mit den feinsten Bronchen. Linke Lunge zeigt ebenfalls ganz vereinzelte, sparsame bis kirchen-grofse conglomerirte, käfige Herde. Einzelne kleine Bronchialdrüfen enthalten bereits hanfkorngrofse käfige Tuberkel. Die betreffende Drüse selbst ist bohngrofs. Mikroskopische Untersuchung unterblieb.

XV. Fall: Anatomische Diagnose: Rechtsseitige tuberkulöse Pleuritis; käfige Pneumonie; circumscripte, lobuläre Desquamativ-Pneumonie; Hochgradige Lungen-Cirrhose mit chronischer Atelectase; Lungenödem; Bindegewebige, cirrhotische Peribronchitis mit Bronchiektasien; Eitrige und käfige Bronchitis; käfige Tuberkulose der Bronchialdrüfen. — Aelteres Thier. —

Rechtsseitige hochgradige Perlsucht, besonders der mittleren und vorderen Parteen. Linke Pleura normal. Im Lungengewebe selbst rechts entsprechend den bedeckten Stellen ein über kindskopfgrofses Conglomerat von käfigen Herden, welche durch ein derbes, schwartiges, milchweisses, hochgradig cirrhotisches Bindegewebe vereinigt sind. Im Hinterlappen das Lungengewebe ödematös, sonst normal. Linke Lunge zeigt in ihren vorderen und unteren Particen chronische Atelectase, Collaps des Gewebes, welches gleichzeitig grauweisslich, lobulär im Umfange von etwa zwei Handtellern subakut infiltrirt erscheint. (Die am frischen Präparate vorgenommene mikroskopische Untersuchung ergab die Alveolen mit Epithel gefüllt, das alveoläre Gerüste zellig infiltrirt, das interlobuläre Bindegewebe in Zunahme.) Größere Bronchen, namentlich links mit käfigen Massen angefüllt. Die Bronchialdrüfen bis faustgrofs vergrößert, verkäuf, in vorgeschrittenem Zerfall. Größere Bronchen und Trachea frei.

Zwei Schnitte wurden durch auffallend cirrhotische Stelle sowie lobulär subakut infiltrirtes Gewebe der linken Lunge geführt. Erstere zeigt das Stadium der höchsten Cirrhose, das alveoläre Gerüste ist geschrumpft, verdünnt, die Alveolen sind bis auf das dreifache erweitert, theils collabirt, ebenso besteht hypertrophische

Cirrhose der Bronchen; dieselben erweitert, mit derben, schmalen Bindegewebszügen umgeben. Das infiltrirte Gewebe zeigt Desquamativ-Pneumonie im Uebergang in Cirrhose, die Alveolen sind mit Epithel gefüllt, das alveoläre Gerüste ist zellig infiltrirt, das interlobuläre durch bindegewebige Wucherung verbreitert.

XVI. Fall: Anatomische Diagnose: Perlsucht der Pleura rechts; Rechtsseitige käfige Pneumonie; Lungencirrhose rechts; Emphysem links; Käfige Peribronchitis und Bronchiaktasien rechts; Tracheal- und Bronchial-Tuberkulose rechts; Eitrige und käfige Bronchitis. —
Erwachsenes Thier. —

Lungen etwa 30—35 Pfund schwer. Rechte Lunge enorm ausgedehnt, linke emphysematös, mälsige Perlsucht der Pleura rechts, linke Pleura vollständig frei. Rechter Vorderlappen emphysematös ohne jegliche Einlagerung. Rechte Lunge mehr als die Hälfte cirrhotisch, aus gewuchertem, milchig-weißem Bindegewebe bestehend, unter dem Messer knirschend, von zahlreichen kleineren käfigen Herden durchsetzt und außerdem zahlreiche, sack- und spindelförmige Bronchiaktasien enthaltend, welche mit schleimig-käfigem Inhalt erfüllt sind. Die größten Bronchiaktasien über Gänseei groß. Die ganze Infiltration vom gefunden Gewebe wenig abgegrenzt und nur auf dem infiltrirten Theile finden sich die Perlknoten. Linke Lunge vollständig normal, nur an einer Stelle mehrere Stecknadelkopf bis Hanfkorn große, käfige, peribronchitische Herde. Die großen Bronchen rechts mit enormen käfigen und eitrigen Massen angefüllt. Mälsige Tracheal- und Bronchialtuberkulose. (Interessant ist, daß die eine Lunge fast vollständig frei ist.) Rechter Mittellappen verhält sich vollständig ähnlich wie die anderen beschriebenen Theile rechts. Bronchialdrüsen fehlen.

XVII. Fall: Anatomische Diagnose: Tuberkulöse Pleuritis beiderseits; Miliare Lungentuberkulose; Tuberkulöse Peribronchitis rechts; Käfige Peribronchitis links; Bronchiaktasien links; Bronchial- und Trachealtuberkulose; Tuberkulose der Bronchialdrüsen. —
Jüngeres Thier. —

Perlfucht beider Pleuren in mäßigem Grade, die Perlknoten ziemlich stark verkäst, theilweise aber frisch grau gefärbt. In der rechten Lunge in den hinteren, unteren Partien frische und alte peribronchitische Knötchen in geringer Zahl. Im Mittellappen der linken Lunge nach Unten, direkt im Zusammenhang mächtiger Perlwucherungen der Pleura, käfige Peribronchitis, Bronchiektasien und gröfsere Miliartuberkel im Umfange von nahezu einem Gänseei. Mäßige Trachealtuberkulose. In den kaum vergrößerten Drüsen frische Tuberkel.

Mikroskopische Untersuchung fand nicht statt.

XVIII. Fall: Anatomische Diagnose: Pleura beiderseits normal; Beiderseits käfige Pneumonie; Cirumscripte Desquamativ-Pneumonie; Lungencirrhose und Bronchiektasien; Käfige und zellige Peribronchitis. — Ganz junges Thier. —

Pleura beiderseits normal, nur rechts höckerig aussehend durch gröfsere und kleinere Lungenknoten. Letztere haselnufs- bis hühnereigrofs liegen in einer Zahl von ungefähr 7—8 in den vorderen und mittleren Lungenpartien; die kleinsten solitär, stark verkäst, die gröfseren conglomerirt und mit Bronchiektasien verbunden. In der linken Lunge nur 3—4 erbsen- bis kirchengrofs, käfige Knoten von kautschukartiger Consistenz und theilweise aus ihrer Bindegewebskapfel vollständig ausschälbar. Trachea und Bronchen frei; Bronchialdrüsen fehlten.

Die mikroskopischen Schnitte stammen von zwei kleinen Knoten aus der linken Lunge und deren Umgebung; die Knoten central verkalkt zeigten am Rande sehr ausgesprochene zellige Wucherung; einzelne Bindegewebszüge gingen von einem Knoten in das Gewebe. Daselbe war in direkter Nähe des Knoten comprimirt, atelektatisch, zellig infiltrirt, cirrhotisch; ein an das infiltrirte Gewebe angrenzender Lobulus zeigte circumscripte Desquamativ-Pneumonie, die Alveolen mit Epithel gefüllt. Ein gröfserer an einem Knoten anliegender Bronchus zeigte sich an der Seite von demselben durchbrochen und in dem relativ sonst normalen Theile der Wandung zellige Wucherung. Die gröfseren Bronchen erweitert mit derbem Bindegewebe umgeben.

XIX. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits tuberkulöse Pleuritis; Miliare Lungentuberkulose; Käfige Pneumonie mit Cavernenbildung; Käfige Peribron-

chitis; Bronchiektasien durch Leberegel bedingt. — Jüngeres Thier. —

Mäßige Perlfucht der mittleren und vorderen Parteen der rechten Lunge, ähnlich links. Im Lungengewebe rechts vereinzelte käfige, abgekapselte Herde, höchstens erbsengroß. In den hintersten und obersten Parteen frischere, lobulär angeordnete, miliare, graue Knötchen. Im Vorderlappen links eine hühnereigroße Bronchiektasie mit schleimigem und käsigem Inhalt gefüllt. In den mittleren Theilen der linken Lunge einzelne conglomerirte, hanfkorn- bis erbsengroße, offenbar peribronchitische, käfige Heerde. Trachea und Bronchen normal. Bronchialdrüsen fehlten. (Nahe dem scharfen Rande rechts eine Leberegel Bronchiektasie mit schmierigem, schmutziggelbemem Inhalt ausgefüllt.)

XX. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits tuberkulöse Pleuritis; Tuberkulöse Peribronchitis links, käfige rechts und links; Bronchiektasien links; Eitrige Bronchitis. — Mittelgroßes Thier. —

Pleura zeigt rechts ganz vereinzelte kleine Perlknoten. Links nahe dem scharfen Rande ebenfalls etwas zahlreichere bis mandelkerngroße Perlknoten, einzelne hämorrhagisch infiltrirt. In der rechten Lunge mehrere hühnerei- bis gänseeigroße bronchiektatische Herde mit käsig-schleimigen Massen gefüllt. Bronchialwandung an diesen Stellen dicht mit käfigen Knoten besetzt. Linke Lunge zeigt nur ganz vereinzelte, ähnlich beschaffene aber kleinere, käfige Knoten. Der Hauptbronchialstamm des Hinterlappens mit zahlreichen, käfigen Tuberkeln und Bronchiektasien besetzt. Trachea und größere Bronchen frei. Bronchialdrüsen fehlen.

Mikroskopische Untersuchung nicht vorgenommen.

XXI. Fall: Anatomische Diagnose: Beiderseits tuberkulöse und bindegewebige Pleuritis; Käfige rechtsseitige Pneumonie; Tuberkulöse Peribronchitis links; Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Mittelgroßes Thier. —

Beide Pleuren ziemlich dicht und gleichmäßig besetzt mit zahlreichen feinen, miliaren Knötchen, welche ebenso wie größere bis linsengroße Knoten in ein sammtartiges Bindegewebsgerüste eingebettet erscheinen. Im Lungengewebe rechts vorne

stark verkalkte und verkäste conglomerirte Herde. Das übrige Lungengewebe fast vollständig frei. In der linken Lunge finden sich einzelne bis hanfkorngröfse, peribronchitische Knötchen. Trachea und Bronchen frei. Einzelne kleine bis bohngrofse Bronchialdrüsen enthalten mehrere gelbliche, käfige Tuberkel.

Mikroskopische Untersuchung wurde nicht vorgenommen.

XXII. Fall: Anatomische Diagnose: Linksseitige tuberkulöse Pleuritis; Rechts käfige Pneumonie mit Cavernenbildung; Lungencirrhose, rechts; Bronchiektasien rechts; Emphysem rechts; Tuberkulose, eitrig-eitrige und käfige Bronchitis; Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Ausgewachsenes Thier. —

Lunge circa 30 Pfund schwer, beide Hälften voluminös. Pleura nur links Hinten mit gröfseren, gestielten, conglomerirten Perlknotten besetzt. Rechte Lunge in ihren mittleren und hinteren unteren Partien im Umfange von zwei Kindsköpfen mit käfigen Herden dicht durchsetzt. Das Lungengewebe theilweise cirrhotisch, dazwischen zahlreiche Bronchiektasien. Das übrige Lungengewebe stark emphysematös und enthält nur einzelne, käfige bis kirschgrofse Knotten. Im Mittellappen der linken Lunge nach Unten ebenfalls im Umfange eines Kindskopfes ein Conglomerat von käfigen Knotten, meistens central erweicht, mit Bronchien vielfach communicirend. Im Hinterlappen links entsprechend den erwähnten Perlknotten ebenfalls ein faustgrofses Conglomerat käfig-eitriger Knotten. In der Mitte eine grofse Caverne (falsche Bronchiektasie) mit käfig-eitrigem Inhalte gefüllt. Bronchialdrüsen stark verkäst, Trachea in den unteren Partien frei, in den Bronchen reichliche Mengen eitrig-käfigen, schleimigen Inhaltes und einzelne Tuberkel.

Keine mikroskopische Untersuchung.

XXIII. Fall: Anatomische Diagnose: Rechtsseitige tuberkulöse Pleuritis; Tuberkulose (käfige) der rechten Lunge; Desquamativ-Pneumonie rechts; Käfige Pneumonie links; Beginnende Lungencirrhose links; Käfige Peribronchitis; Tuberkulöse Peribronchitis; Bronchial- und Trachealtuberkulose. — Jüngeres Thier. —

Rechts mäfsig entwickelte Perlucht auf der Pleura; die Perlknotten meist kirschkern- bis kirschgrofs, etwas flach ge-

drückt, kaum verkäuft. Rechts auf dem Vorderlappen eine grössere Zahl bis feigengroßer gelbbrauner Perlknoten. Rechte Lunge zeigt im Gewebe rechts Hinten frisches, lobuläres, wahrscheinlich desquamatives Infiltrat mit beginnender Verkäufung, das Ganze über faustgroß. In der übrigen rechten Lunge nach Oben eine mäfsige Zahl bis kirschgroßer, grauer, theilweise verkäufte Tuberkel. In der linken Lunge ähnliche Knoten. Der Hinterlappen im Umfange eines halben Manneskopfes in lobulärer Verkäufung mit leichter Verkalkung. Bindegewebe mäfsig vermehrt, in der Umgebung vereinzelte käfige, peribronchitische Herde. Im unteren Theil der Trachea und in den größeren Bronchen ziemlich zahlreiche, hanfkorngroße, graue Knoten, die vielfach confluiren und der Schleimhaut ein reibeisenförmiges Aussehen verleihen. Bronchialdrüsen fehlen.

Die 17 Präparate wurden durch hochgradig tuberkulös infiltrirte kleinere Bronchialstämme in vertikaler und horizontaler Richtung verfertigt. Wenn wir von der Schleimhaut gegen die Lunge zu vorgehen, so erhalten wir folgende combinirte Bilder. Die Mucosa zeigt stellenweise nur mehr sparame Reste des Cylinderepithels, an manchen Stellen fehlt es vollständig. In den obersten Schichten vielfach fettig-körniger Zerfall und Nekrose, der sich an einem Präparate durch alle Schichten des Bronchus bis auf den selbst keilförmig zerfressenen Knorpel erstreckt; die umgebenden Schichten sowie der Knorpel selbst zeigen massenhafte, rundzellige Infiltration. Die Mucosa ist ungleichmäfsig, höckerig gefurcht, bucklich zerfressen; diffuse und herdförmige hochgradige Infiltration mit Rundzellen mit enormer Verdickung. In dem verdickten Gewebe fanden sich zahlreiche Riesenzellen eingestreut. An einzelnen Stellen derbere, bindegewebige Stellen mit Uebergang in Cirrhose. Die hochgradige, rundzellige Infiltration erstreckt sich auf die Submucosa und auch auf die sonst gut erhaltene Muskularis. An manchen Präparaten sind sonst alle übrigen Theile in dem entzündlichen Infiltrate untergegangen, manchmal nur noch Reste von Schleimdrüsen mit theils erhaltenem Epithel zu sehen. Die Tuberkelknoten finden sich in verschiedener Gröfse, bis fast erbsengroß, zahlreich in der Mucosa, Submucosa und Muskularis und den unter dem Bronchialknorpel gelagerten drüsigen Theilen eingelagert, theils central verkäuft, theils mit schönem zelligem Bau und zahlreichen Riesenzellen; das umgebende Gewebe stets hochgradig zellig infiltrirt und comprimirt. Mastzellen in mäfsiger Menge in das submucöse Bindegewebe eines Präparates eingestreut (Saffranin-Färbung).

XXIV. Fall: Anatomische Diagnose: Bindegewebige und tuberkulöse Pleuritis beiderseits; Lungentuberkulose; Käfige Pneumonie; Käfige Peribronchitis; Bronchiektasien; Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Eitrige Bronchitis. — Junges Thier. —

Pleura zum größten Theile beiderseits normal, enthält nur stellenweise beiderseits bindegewebige Wucherungen und hanfkorngroße Knötchen. Auf der rechten Lunge sind dieselben in Haufen und traubenförmig vereinigt und hängen gestielt an der Pleura. Die Knötchen sind auf dem Durchschnitt gelblichgrau, saftig. Außerdem fühlt man rechts einige stark prominirende und fluctuirende Geschwülste. Dieselben erweisen sich als Echinococcusblasen. Beim Einschneiden in die linke Lunge zeigt sich der größere Theil lufthaltig und blutarm. Das interstitielle Gewebe ist stellenweise stark vermehrt, verbreitert. Zudem findet man an verschiedenen Stellen käfige und verkalkte Knoten, besonders im Hinterlappen, welche zum Theil sackartig erweiterten Bronchen entsprechen; außerdem hanfkorn- bis erbsengroße Tuberkel in der Umgebung des Knotens in das Gewebe diffus eingestreut. In der rechten Lunge ebenfalls zusammensitzende, verkäste Tuberkel, einzelne kirchgroße, käfige Herde und erweiterte Bronchen mit käsig eitrigem, grünlich gefärbtem Inhalte; auch die kleineren Bronchen mit eitrigem Sekret gefüllt. Trachea und größere Bronchen frei. Bronchialdrüsen geschwellt, enthalten zahlreiche, Stecknadelkopf große trüb-gelbe Tuberkeln.

Mikroskopische Untersuchung wurde nicht vorgenommen.

XXV. Fall: Anatomische Diagnose: Fibrinöse und tuberkulöse Pleuritis beiderseits; Tuberkulose der Lunge; Käfige Pneumonie; Beginnende Cirrhose und Bronchiektasien; Tuberkulose der Bronchialdrüsen. — Erwachsenes Thier. —

Die Pleura beiderseits nur leichte bindegewebige Auflagerung und ganz vereinzelte, flach gedrückte Perlknoten aufweisend. In dem hellrothen und lufthaltigen Lungengewebe wenig zahlreich, beiderseits in den Mittellappen je 3—5 welsch-nußgroße Knoten von gewöhnlicher Beschaffenheit mit grün-gelblichem, dickeitrig-käsigem Inhalt. In der nächsten Umgebung der Knoten in entzündlich geröthetem Lungengewebe ziemlich

zahlreiche stecknadelkopf- bis linsengroße Knötchen, central trüb-gelblich, halbweich, umgeben von einer weißlichen Bindegewebschichte. Dieselbe ist gebildet durch den in Folge chronischer fortgesetzter Bindegewebswucherung in Bindegewebe umgewandelten rothen entzündlichen Hof des miliaren grauen Knötchens. Die Bronchialdrüsen sind mäsig vergrößert; die größte bis gänseeigroß, besteht ungefähr zur Hälfte aus derbem Bindegewebe, in welchem eingestreut sich verschiedene große, käfige Herde finden von miliarer bis zu Haselnußgröße. Die kleinsten Knoten mehr an der Peripherie.

Hiermit schließt das mir zu Gebote stehende Material.

Koch's Erfolge im Auffinden von Bacillen auch bei mit Perlucht behafteten Rindern, die er in seiner am Beginne der Arbeit erwähnten Brochüre »Die Aetiologie der Tuberkulose« beschreibt, gaben die Veranlassung, zu versuchen, auch jene gefährlichen Organismen an meinen Präparaten zur Darstellung zu bringen, zumal Koch dieselben in sämtlich zehn untersuchten Fällen von Perlucht und zwar in so gleichmäßiger Vertheilung vorfand, daß kaum eine Riesenzone zu finden war, welche nicht eine mehr oder weniger große Anzahl von Bacillen umschloß. An 30 Schnitte wurden durch die denkbar besten Stellen für Bakterienkolonien gemacht, theils durch verkäste Herde, durch Bronchiektasien mit käsigem Inhalt, durch frische Lungeninfiltration mit Tuberkeln und den schönsten Riesenzellen, aber auch nicht in einem Präparate gelang es mir, eine Spur von Pilzformen zu entdecken. Die Lösung war genau nach Vorschrift verfertigt und die Methode exakt nach Koch durchgeführt worden; außer auffälliger Anhäufung von Farbstoff an verschiedenen Stellen war nichts zu entdecken. Der Grund für das negative Resultat muß wohl in einer fehlerhaften Bereitung der Lösung gesucht werden. Später vorgenommene, neue Versuche nach der Methode von Ehrlich (Fuchsin-Färbung), mittelst welcher die Lungenbakterien bei menschlicher Tuberkulose im pathologischen Institute zu München

in schönster Weise gefärbt und sichtbar gemacht werden, ergaben an der Rindslunge daselbe negative Resultat. Die angefertigten Schnitte wurden von frisch geschlachteten, hoch perlsüchtigen Rindern durch einen Knoten der Pleura, einen solchen der Lunge und durch feinkörnig infiltrirtes Gewebe in hinreichender Anzahl und in verschiedener Richtung geführt. Obwohl ein Theil der Schnitte in dem einen Falle 24 Stunden, in einem anderen 3 Tage auf dem Bruttofen (was für die Pilzentwicklung günstig wirken soll) gelegen, war es nicht möglich die Bacillen zu finden; sechs Quetschpräparate von frischem Bronchialinhalt hatten den gleichen Misserfolg. Die von dem Studierenden der Medizin, Rosengart, verfertigten weiteren Quetschpräparate von frischen Tuberkeln und Bronchialinhalt hatten daselbe Resultat. Endlich wurden bei einem exquisiten Falle allgemeiner Perlsucht fünfzehn Quetschpräparate mit citrig-käsigem Bronchialsekret, frischen Tuberkeln der Lunge, Leber und Milz verfertigt. Das Ergebniss waren höchstens 4—6 deutlich gefärbte Bacillen vereinzelt im freien Felde liegend. Woran der Misserfolg in diesem Falle liegt, ist mir nicht recht klar, da doch anzunehmen ist, dass bei identischem Prozesse der menschlichen Tuberkulose und der Perlsucht es gelingen müsste, die Bakterien zum Vorschein zu bringen, nachdem dies bei menschlicher Tuberkulose sehr gut gelungen war. Vielleicht ist es an einem Tuberkelnknoten nur eine einzige Stelle, an der die Pilzinvasion stattgefunden hat, und dass gerade diese getroffen werden muss, um die Bacillen aufzufinden. Koch wird vielleicht eine große Anzahl von Schnitten durch ein und denselben Knoten geführt und sie so gefunden haben; nur ist es auffallend, dass er sie mit großer Regelmässigkeit in fast allen Riesenellen gesehen hat und wird deshalb doch wahrscheinlich noch ein Fehler in der Technik vorliegen.

Wenn wir demnach die Ergebnisse der mikroskopischen und makroskopischen Untersuchungen zusammenfassen und einen Blick auf beiliegende Tabelle I werfen, so muss uns vorerst

das Ueberwiegen der entzündlichen Veränderungen in den Lungen gegenüber der tuberkulösen Affektion in's Auge fallen. Bei der Mehrzahl der Fälle war die Veränderung in den Lungen bereits weit vorgeschritten, das Gewebe in hochgradigem Zerfalle, die Lungenlappen theilweise bei großer Gewichtszunahme enorm vergrößert. In 22 Fällen war es ausgedehnte oder geringere käfige Pneumonie, durch welche die Lungen ergriffen waren, meist beiderseits besonders in den mittleren und hinteren Partien lokalisiert. Die käfige Pneumonie war meist lobulär angeordnet, das interlobuläre Gewebe in mehr oder weniger derben, weissen Zügen dazwischen sichtbar. Die käfigen Knoten oft um größere und kleinere Bronchen geordnet, stets von derbem, peribronchialen Bindegewebe umschlossen (käfige Peribronchitis), zeigten in ihrer Mitte fast stets Verkalkung, an der Peripherie bindegewebige Structur; manchmal waren die Bronchen von den anliegenden käfigen Knoten durchbrochen. Weitere Ausdehnung der käfigen Pneumonie führte zu vollständigem Zerfalle derselben, zur Bildung großer Cavernen, in welche zahlreiche Bronchen mündeten, gefüllt mit eitrig-käfigem Inhalte. Das Gewebe in der Umgebung käfiger Knoten war fast immer akut oder subakut infiltriert. Während das direkt anliegende Gewebe Compression, Atelectase, Verdichtung und Verdickung zeigte, die sich auch auf die anliegenden Bronchen und Alveolen erstreckte, hatte das in den angrenzenden Lobulis gelegene Gewebe zweierlei Formen entzündlichen Infiltrates aufzuweisen. Entweder frische diffuse oder auch manchmal eigenthümlich lokalisierte (auf 6—8 Alveolen) Desquamativ-Pneumonie mit zelliger Infiltration des Alveolargerüstes und Vollpfropfung der Alveolen mit Epithel, oder bereits chronische Veränderung, das Stadium der Cirrhose, mit Verbreiterung und Verdichtung des interlobulären Bindegewebes und mit Zunahme des intervalveolären Gerüstes bis zur äußersten Schrumpfung des Gewebes und Erweiterung der Alveolen und Infundibula; vom ersten bis zum letzten Stadium

TABELLE I
der
verschiedenen Formen der Lungen
Affectionen.

	Tuberkulose d.						Pneumonie u. Cirrhose				Peribronch. Bronch.				Begleitendes.							
Fälle	Pleura	Lunge	Peribron	Bronch.	Trachea	Bronch. lig.	Croup.	Desqu.	Käsig.	Cirrhose	Brand d. L.	Pleuritis chron.	Bindeg.	Veilige	Känge	Eitrig	Känge	Atelektase	Emphyse	Oedem.	Mucillen	Alter der Thiere
1																						Jung. Thier
2																						Erw.
3																						Erw.
4																						Älteres
5																						Erw.
6																						Jung.
7																						Jung.
8																						Erw.
9																						Jung.
10																						Ausgew.
11																						Jung.
12																						Ausgew.
13																						Jung.
14																						Jung.
15																						Älteres
16																						Erw.
17																						Jung.
18																						Jung.
19																						Jung.
20																						Mittelgr.
21																						Mittelgr.
22																						Ausgew.
23																						Jung.
24																						Jung.
25																						Erw.
Summe	24	14	5	8	5	12	1	7	22	16	14	7	9	2	12	14	2	6	2	1	4	

Tuberkulöse Erkrankung
 Entzündliche
 Andere krankhafte Veränderungen.

der Cirrhose war das Gewebe verändert zu beobachten. Der stete Begleiter war starke, bindegewebige Peribronchitis, die in den höchsten Stadien zur Schrumpfung der bindegewebigen Stränge, zu hypertrophischen (nach Buhl) Bronchiektasien führte; in zwei Fällen konnte auch bedeutende Hypertrophie mit massenhafter Zunahme der interlobulären, und circulären, peribronchialen, glatten Muskelemente beobachtet werden (Muskel Cirrhose). Oedem und Emphysem der Lunge war selten vorhanden. Croupöse Pneumonie kam nur in einem Falle, circumscript auch in Nähe käfiger Infiltration zur Beobachtung. Von reiner Lungentuberkulose — wie sie Siedamgrotzky beschreibt — war nur ein Fall zu verzeichnen, gepaart mit Perlfucht der Pleura und der Bronchialdrüsen. Käfige Pneumonie und Tuberkulose war in den 25 Fällen nur 11mal nachzuweisen, der tuberkulöse Prozess in den Lungen betrug demnach nur etwa 44%. Wir sehen, dass Siedamgrotzky mit Recht betont, dass in den meisten Fällen der Ausdruck Lungentuberkulose gar nicht passt. Gefällt sich die Tuberkulose zu den destruktiven, entzündlichen Formen der Lunge, so haben wir den höchsten Grad der Lungenerkrankung beim Rinde. In den Fällen, wo wir Lungentuberkulose fanden, waren die Lungen fast stets im Stadium hochgradiger Verkäufung und ist es nicht zu leugnen, dass die Tuberkeleruptionen stets in der Nähe frischer, käfiger Infiltrationen nachzuweisen waren. Von miliaren Knötchen bis zu Hantkorn- und Erbsen-Größe fanden sie sich in nicht zu zahlreicher Weise theils diffus, theils conglomerirt in lufthaltiges Lungengewebe, besonders in das interalveoläre Gerüste, aber auch häufig in die Wandung kleinerer und gröfserer Bronchen und in die Umgebung von Gefäfsen eingestreut. Die Tuberkel im Lungengewebe übten auf das umgebende Gewebe entschieden entzündlichen Reiz aus, indem sich dasselbe stets kleinzellig infiltrirt zeigte. In der Bronchialwandung waren sie stets von vermehrtem Bindegewebe umgeben, welches sich ebenfalls kleinzellig infiltrirt zeigte. Die

Tuberkel waren häufig central verkalkt und liefsen nur an der Peripherie zelligen Bau mit sparsamen Riesenzellen erkennen; andere dagegen zeigten auffallenden fibro-farkomartigen Bau, mit schönen Riesenzellen. Während die käfige Pneumonie trotz hochgradigen Zerfalles und Durchbruches in die Bronchen wenig Einfluß auf die Bronchialschleimhaut ausübte, sahen wir bei der Tuberkulose der Lungen fast stets Tracheal- und Bronchialtuberkulose in Begleitung von tuberkulösen Anätzungsgechwüren der Schleimhaut auftreten. In einem Falle hatte Trachea und die gröfseren Bronchen ein Reifeisen ähnliches Aussehen, mit hochgradigem tuberkulösen Zerfall der Schleimhaut bis auf die Muskularis.

Siedamgrotzky's Eintheilung der Lungen-Affektionen perlfüchtiger Rinder in drei grofse Gruppen

I. Käfige Pneumonie;

II. Eigentliche Lungentuberkulose, Miliare, diffeminirte Tuberkulose;

III. Käfige Pneumonie und sekundäre Tuberkulose

läfst sich demnach sehr wohl auch bei diesen Fällen anwenden. Nur glaube ich, dafs »Käfige Pneumonie« allein als Diagnose nicht die Erscheinungen in den Lungen zusammenfassen kann. Denn sehen wir auch in dem käfigen Prozeß makroskopisch das Lungengewebe vollständig aufgegangen, so finden wir doch mit dem Mikroskop, wie in dem noch bestehenden, umgebenden Gewebe die akute Infiltration constant weiter schreitet, und vom subakuten bis chronischen Stadium alle Uebergangsformen der Desquamativ-Pneumonie bis zum letzten Stadium der Cirrhose zu finden sind. Und dann ist doch in vielen zur Schlachtung kommenden Fällen das akute und subakute entzündliche Stadium noch bedeutend höher vorhanden als das Endprodukt desselben, die käfige Pneumonie. Wir sehen demnach in der käfigen Pneumonie nur das Endresultat des akuten entzündlichen Processes, für welchen Ausgang der anatomische Bau der Rindslunge besondere Disposition zu bieten scheint. Es wäre demnach

vielleicht besser, von »Entzündlicher destructiver Affektion der Lunge mit oder ohne Ausgang in käfige Pneumonie« zu sprechen. In vier Fällen habe ich, wie schon erwähnt, eigenthümliche, grofse, dunkeltingirte Zellen in massenhafter, unregelmässiger Anordnung gefunden; die Lungenerkrankung war entzündliches Infiltrat mit Ausgang in käfige Pneumonie, dreimal von miliärer Tuberkulose der Lunge begleitet. Die Thiere waren bis auf eines ausgewachsen. Die Zellen finden sich in interlobuläres, intervalveoläres und das die Bronchen und gröfsere Gefäße umgebende und beginnendes oder höheres Stadium von Cirrhose zeigende Bindegewebe eingestreut, und zwar in massenhafter Zahl in der Nähe käfiger und tuberkulöser Herde. Die Form der Zelle ist eine rund-ovale, ihr grofser mit mehreren Kernkörperchen versehener dunkler Kern füllt fast die ganze Zelle aus und läfst nur einen geringen Saum an zwei gegenüberliegenden Stellen erkennen; das Protoplasma ist feinkörnig getrübt, auch dunkel gefärbt. Nur bei Färbung mit Bismarkbraun und Saffranin kamen die Zellen zum Vorschein und nur bei den erwähnten vier Fällen; mit Bismarkbraun waren dieselben weniger intensiv tingirt, liefsen jedoch den Bau besser erkennen als die mit Saffranin, dagegen färbten sie sich mit letzterem tief dunkel und hoben sich bei schwacher Vergröfserung massenhaft von dem Gesichtsfelde in bindegewebige Züge eingestreut wie fein körniges, schwarzes Pigment ab. In einem Falle, in welchem die Zellenanhäufung besonders stark war, fanden sich dieselben nicht nur im Bindegewebe, sondern sogar in der Wand der Blutgefäße und selbst in der Schleimhaut eines quer getroffenen Bronchus bis in das Epithel hinein (Taf. II, Fig. 1; Taf. III, Fig. 2). Sie sind entschieden identisch mit den von Ehrlich¹⁾ in seinem »Beitrag zur Kenntnifs der granulirten Bindegewebszellen etc.« beschriebenen Mastzellen. Ehrlich theilt nicht die Ansicht Waldeyers,

¹⁾ Archiv für Anatomie und Physiologie. Physiologische Abtheilung.

dafs die grobgranulirten Zellen, welche an den verschiedensten Stellen des lockeren Bindegewebes vorkommen, mit den Bildungszellen des Embryonalkörpers, der Hodenzwischensubstanz etc., Glieder einer Kette seien. Er trennt vielmehr die im Bindegewebe nachweisbaren Elemente unter dem Namen »granulirte Zellen« ab, da sie sich in basischen Anilinfarben lebhaft färben, was die übrigen Waldeyer'schen Plattenzellen nicht thun. Es scheint dem Verfasser, dafs diese Zellen die Neigung haben, sich besonders an den Stellen zu localisiren, an denen das Bindegewebe sich gegen irgend welche präformirte Fläche oder Röhre absetzt. Pathologische Befunde geben den Nachweis, dafs sich die »granulirten Zellen« aus den fixen Bindegewebszellen entwickeln, wenn dieselben in gesteigerten Ernährungszustand versetzt werden. Als Produkte der Mäftung der Bindegewebszellen könnte man sie auch als »Maftzellen« bezeichnen. Dieselben sollen sich nach Bonnet physiologisch auch beim Kalbe vorfinden, aber auch nur bei manchen Thieren. Das Auftreten jedoch in solcher Menge, und hauptsächlich oder nur in der Umgebung der käfigen oder tuberkulösen Prozesse und ihr Fehlen in allen normalen Lungenpartieen, ist so eigenthümlich, dafs ihr Vorhandensein jedenfalls mit der entzündlichen Erscheinung in Zusammenhang gebracht werden mufs. Ihr Auftreten im Bindegewebe läfst sie mir als in Folge des entzündlichen Reizes besonders entwickelte Bindegewebszellen erscheinen. Eine gewisse Aehnlichkeit mit den von Virchow¹⁾ beschriebenen Zellen, welche als erster Beginn der Riesenzelle beim Rinde sich im wuchernden Bindegewebe aus vergrößerten Bindegewebskörperchen mit vergrößertem Kerne und getheilten Kernkörperchen bilden sollen, ist nicht zu leugnen, doch bei dem massenhaften Auftreten der Zellen und den so sparsamen Riesenzellen sehr unwahrscheinlich, dafs es dieselben sind. Was die Lokalisation des krankhaften

¹⁾ Virchow's Archiv. B. 49. P. 47.

der Localisation der Erkrankungen.

25 Fälle.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Gesamtsumme.
Vord. Part.																										r 3 r 2
Zug-Vord. Lapp.																										5 rechts
Vord. Part.																										l 4 l 4
Zug-Vord. Lapp.																										8 links
Mittel Part.																										r 5 r 3
Mittel Lapp.																										8 rechts
Mittel Part.																										l 7 l 3
Mittel Lapp.																										10 links
Hint. Part.																										r 4 r 6
Hint. Lapp.																										10 rechts
Hint. Part.																										l 4 l 4
Hint. Lapp.																										8 links



Vorder Lappen u. vordere Partien.

Mittel Lappen u. mittlere Partien.

Hinter Lappen u. hintere Partien.

Prozesses in den Lungen anlangt, so ist aus der Tabelle II ersichtlich, daß im Allgemeinen eine ziemlich gleiche Verbreitung der Erkrankung vorhanden war, daß jedoch die mittleren und hinteren Parteen, wie auch Siedamgrotzky angibt, besonders von dem krankhaften Prozesse ergriffen waren, Bezirke, welche die Sekretionsausscheidung erschweren und durch ihre Lage den besten Angriffspunkt bilden.

Auf Grund meiner Untersuchungen bin ich demnach zu folgendem Schluß gekommen. Die Lungenaffektion bei mit Perlsucht behafteten Rindern ist in einer großen Anzahl von Fällen unabhängig von der tuberkulösen Erkrankung der serösen Häute und ist ein destructiver, entzündlicher Prozess (Desquamativ-Pneumonie und Lungen-Cirrhose in allen Stadien), welcher bei rascher, proliferirender, entzündlicher, interstitieller und parenchymatöser Zellbildung und Abstoßung des Alveolenepithels, dem anatomischen, disponirenden Bau der Rindslunge und dem Stagniren des Bronchialsekretes besonders zu raschen nekrotisirenden, käfigen Zerfall führt. Die lobuläre Form und der Sitz der Erkrankung in direkter Umgebung der Bronchen ist vorherrschend und sind dieselben stets stark in Mitleidenschaft gezogen. Ist der entzündliche Prozess von tuberkulöser Neubildung begleitet, so zeigt sich dieselbe in der Form miliärer und größerer Knötchen in der Umgebung frischer, käfiger Herde in lufthaltiges Lungengewebe oder in die Wand der Bronchen eingelagert und stets jüngere Form als der vorhandene, entzündliche Prozess der Lunge. Tuberkulose der Pleura war in fast allen Fällen vorhanden und kann dieselbe eine primäre, idiopathische, unabhängig von einem destructiven Lungenprozesse, oder eine sekundäre, deuteropathische, abhängige in Folge der Lungenerkrankung sein. Doch ist zu constatiren, daß wenn auch die Eruption der Perlknoten der Pleura besonders an Stellen der Lungen, in welchen hoch entwickelte, käfige Herde vorhanden, zu beobachten war, doch nur Pleuratuberkulose bei sonst ganz normaler Lunge

zu finden war und anderseits gerade bei dem hochgradigsten Falle käfiger Lungen-Infiltration und Tuberkulose die Pleuraperlknoten fehlten.

Das causale Moment der Lungenaffektionen ist durch Koch's Entdeckungen bereits gegeben. Es sind kleinste Organismen, Bacillen, welche in das Lungengewebe ihren Eingang finden und die Veränderungen erzeugen. Wie beim Menschen, so muß aber auch hier die Disposition gegeben sein und ist auch vorhanden durch den anatomischen Bau der Rindslunge, durch die mangelhafte Respiration und Expectoration von zur Stallruhe verdammt Thieren, eventueller schlechter Ernährung und Verunreinigung der Luft. Besonders beim Rinde ist zum Stagniren des Sekretes bei einem Bronchialkatarrh Gelegenheit geboten und eine Bronchitis wird in den meisten Fällen das urfächliche und Anfangsmoment der ganzen Erkrankung bilden. Dieselbe kann bei Stagnation des Sekretes sehr leicht eine sekundäre Betheiligung der nicht ventilirten und Sekret aspirirenden Lungenpartieen, Desquamativ-Pneumonie, sekundäre Cirrhose bei massenhafter, entzündlicher Zellbildung im Gewebe und in der Umgebung der Bronchen herbeiführen, bis das Gewebe gewissermaßen in sich selbst erstickt und zerfällt. Das eitrig-käfige Sekretionsprodukt soll in einem gewissen Flüssigkeitsstadium besonders infektiös wirken und wäre es denkbar, daß es den Nährboden für die Pilzorganismen bildet, welche von hier aus in die Umgebung der Herde geschleppt zur miliaren Tuberkeleruption Veranlassung geben. In den Riefenzellen sollen ja nach Koch dieselben constant zu finden sein.

Der Gefahr, welcher man durch den Genuß solcher Thiere, besonders der Milch, ausgesetzt ist, wurde schon an anderer Stelle oft erwähnt. Durch die Einrichtung allgemeiner, controlirter Schlachthäuser in den größeren Städten ist jedenfalls die Gefahr der Infektion durch den Genuß geschlachteter kranker Thiere beträchtlich vermindert worden. Was die Gefahr betrifft, welche die Milch Lungenkranker und perlfüchtiger Rinder

für den Menschen bietet, so wird sich dieselbe nur durch genaue, wiederholte Controle der Gesundheitsverhältnisse des Viehstandes beschränken lassen. Dafs die Lungenaffektion bei mit Perlucht behafteten Rindern wohl eingehender Beachtung werth ist, ergibt sich auch aus der Untersuchung dieser wenigen Fälle, und dafs dieselbe wohl geschieden werden mufs von der sie begleitenden Perlucht, für welche durch die vorhandene Lungenaffektion und bei einer jedenfalls allgemeinen Kachexie und Widerstandsunfähigkeit für den Einbruch der die Perlucht hervorrufenden Bacillen Thür und Thor geöffnet sein wird.

Zum Schlusse kann ich nicht umhin, Herrn Professor Bollinger für seine lebenswürdige thätige Unterstützung, welche es mir allein ermöglichte in meiner Vaterstadt während meines Urlaubes zu promoviren, meinen besten Dank zu sagen.

Erklärung der Tafeln.

Taf. I, Fig. 1. Schnitt durch normales Lungengewebe, welches den regelmässigen Bau und den kleinen Umfang der Rindsalveolen gut erkennen läßt. Das alveoläre Gewebe ist breit, stark entwickelt. — Schwache Vergrößerung.

(Färbung mit Shakespeare und Noris.)

Taf. I, Fig. 2. Schnitt durch die Umgebung eines kleinen, subpleuralen Knoten und feinste Bronchenstämme. Frische bindegewebige Peribronchitis. Der quer getroffene Bronchus ist in der Mitte mit Eiterzellen gefüllt. Das Epithel des Bronchus ist gut erhalten. Derselbe ist umgeben von frischen, dichtgedrängten Bindegewebszellen; dieselben sind in der Zeichnung zu schematisch dargestellt und zeigen mehr epithelialen Charakter. Die Kernfärbung war sehr deutlich ausgesprochen.

(Färbung mit Shakespeare und Noris.)

— Fall II. —

Taf. II, Schnitt durch cirrhotisches Lungengewebe in Umgebung eines subpleuralen, käfigen Knoten. Die Alveolen vollständig obliterirt, überall stark entwickeltes, interalveoläres Bindegewebe, welches die Lungenstructur kaum mehr erkennen läßt. In dasselbe diffus eingestreut massenhafte Mastzellen, die tiefdunkel gefärbt von dem anderen Gewebe stark abstechen.

(Färbung mit Saffranin.)

— Fall II. —

Taf. III, Fig. 1. Schnitt durch dieselbe Stelle wie bei Taf. II, Fig. 2. Achtfache Loupenvergrößerung. Zeigt dreierlei Bilder, welche durch interlobuläres Bindegewebe getrennt

find. a) Vollständig normales, gefundes und b) frisch zellig infiltrirtes Lungenlappchen mit theilweiser Verkleinerung und Verschluss der Alveolen, getrennt durch einen breiteren interlobulären Bindegewebszug von c) mit theils diffusen, theils conglomerirten, miliaren Tuberkeln frisch infiltrirtem Lungengewebe; die nächste Umgebung der Tuberkel ist entzündlich infiltrirt, sonst lufthaltig.

(Färbung mit Shakespeare und Noris.)

— Fall VII. —

Taf. III, Fig. 2. Weiterer Schnitt von demselben Präparate wie Fig. I. Mastzellen in diffuser Menge, tiefdunkel gefärbt, in cirrhotisches, verdichtetes Lungengewebe mit obliterirten Alveolen eingestreut und bis in die stark verdickte Wandung eines Blutgefäßes, die Schleimhaut eines quer getroffenen, bronchiektatischen Bronchus und deren Epithelschichte hinein zu verfolgen. Geringe Pigmentbildung an einer Stelle.

(Färbung mit Saffranin.)

— Fall VII. —

Fig. 1.





Fig. 2.

TAFEL II.

